

## **Склад**

*діюча речовина:* кропиви листя.

## **Лікарська форма**

Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя різної форми. Колір темно-зелений, темно-сірувато-зелений, коричнювато-зелений, зелений.

## **Фармакотерапевтична група**

Вітамін К та інші гемостатичні засоби. Код АТХ В02В Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнювальну, протизапальну та судинозвужувальну дію, сприяють збільшенню вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, нормалізують склад крові, знижують рівень цукру у крові, сприяють регенерації слизових оболонок травного тракту, нормалізують ліпідний обмін.

## **Показання**

Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології, захворювання травного тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків; артеріальна гіпертонія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано у період вагітності. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію.

## **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 12 років – по ½-1 склянці, дітям віком 5-7 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по ¼ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Нудота, блювання, діарея, біль у ділянці шлунка. У разі виникнення побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетах у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.