

Склад

діюча речовина: фенхелю плоди (*Foeniculi fructus*);

1 пачка містить фенхелю плодів (*Foeniculi fructus*) 50 г.

Лікарська форма

Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: плоди – вислоплодники, що розпадаються на два напівплодики (мерикарпії). Зовнішня сторона мерикарпії випукла, внутрішня – плоска. Кожен мерикарпій з п'ятьма дуже виступаючими поздовжніми реберцями. Колір зеленувато-бурий.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовують при функціональних розладах травного тракту. Код АТХ А03А Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини плодів чинять секретолітичну, спазмолітичну, вітрогінну, протимікробну та слабку сечогінну дію.

Показання

Спазми кишечника, метеоризм, запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано у період вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком 10-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 6 місяців.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21