

Склад

діючі речовини: чорниці пагони;

1 фільтр-пакет містить: чорниці пагонів – 1,5 г.

Лікарська форма

Пагони.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки стебел, листя, зрідка бутони, квітки і плоди. Стебла – зелені; листки молоді від світло-зеленого до зеленого кольору, старі листки темніші; віночок – зеленувато-білий з рожевим відтінком; плоди – чорні ягоди з сизуватою поволокою.

Фармакотерапевтична група

Антидіабетичні препарати. Код АТХ А10 Х.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату проявляють гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків знизити добові дози пероральних антидіабетичних засобів; а також мають протизапальну, сечогінну, жовчогінну, в'язучу дію.

Показання

Легкі форми цукрового діабету.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; дискінезії жовчовивідних шляхів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалась.

Спосіб застосування та дози

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити та настояти 15 хвилин. Дорослим приймати у теплому вигляді по ½–1 склянці 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Дітям віком від 3 років, за рекомендацією лікаря, залежно від віку, від 2 десертних ложок до ½ склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °C) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат не призначати дітям віком менше 3 років.

Передозування

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції

При індивідуальній гіперчутливості до біологічно активних речовин препарату можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання, свербіж та набряки шкіри). *При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.*

Термін придатності

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Ліктрави.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.