

Склад

1 мл розчину містить: натрію кармеллоза 3 мг.

допоміжні речовини: вітамін Е, вітамін А, полісорбат 80, гідроскіпропілбетадекс, натрію хлорид, макрогол гліцерин гідроксистеарат, натрію тетраборат, трилон Б, бензалконію хлорид, вода для ін'єкцій.

Показання

«Сенсивіт» застосовується в комплексній терапії при зниженні сльозопродукції і при всіх формах синдрому сухого ока. Можна застосовувати у всіх випадках, що вимагають освіти захисного шару на роговій оболонці і кон'юнктиві очного яблука.

Протипоказання

- підвищена чутливість до компонентів препарату;
- вагітність;
- період лактації;
- дітям до 2-х років.

Особливості застосування

Відразу після закапування може виникнути незначна короточасна нечіткість зору, що може впливати на здатність керувати автомобілем, працювати зі складними механізмами, або працювати на висоті. Тому рекомендується здійснювати вищезазначені дії не раніше, ніж через 20 хвилин після застосування препарату.

Не можна носити м'які контактні лінзи протягом застосування препарату. Жорсткі контактні лінзи перед введенням препарату необхідно вийняти і лише через 20 хвилин після введення препарату можна користуватися ними знову.

При випадковому застосуванні препарату дітьми необхідно звернутися до лікаря.

У разі застосування будь-яких інших очних крапель, необхідно застосовувати «Сенсивіт» в останню чергу, з інтервалом мінімум 5 хвилин після застосування інших крапель.

Ваш лікар повинен бути поінформований про всі лікарські засоби, які Ви недавно використовували, або почнете застосовувати за призначенням лікаря або без нього.

Про можливість одночасного застосування інших очних крапель проконсультуйтеся з офтальмологом.

Спосіб застосування та дози

Якщо немає інших призначень лікаря, закопують одну краплю препарату в кон'юнктивальний мішок ока 1-3 рази на день.

У разі застосування у дітей, дозування повинна бути встановлена індивідуально лікарем.

Препарат можуть застосовувати дорослі і діти від 2-х років.

Після відкриття препарат готовий до закапування в очі.

Для застосування слід відкрутити ковпачок, злегка закрутити головку назад, перевернути пластиковий контейнер догори дном і, стискаючи контейнер, ввести призначену кількість крапель у кон'юнктивальний мішок.

Під час введення препарату не слід торкатися ні ока, ні вії.

Після кожного використання препарату необхідно щільно закривати контейнер.

Побічні реакції

Рідко, після закапування в очі може з'явитися печіння, також може виникнути алергічна реакція (в разі прояву цих або інших небажаних реакцій, зверніться до лікаря).

Термін придатності

Див. на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 ° С.

Не охолоджувати і не заморожувати.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Після розтину оригінальної упаковки зберігати не більше 28-ми діб.

Контейнер необхідно зберігати у вертикальному положенні.

Упаковка

По 10 мл у флаконі в картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Унімед Фарма, ТОВ, Словацька Республіка.