

Склад

Екстракт очанки лікарської (*Euphrasia arctica extract*) 2 мг у 1 мл натрію хлорид (*natrii chloridum*) 7 мг у 1 мл; наповнювачі: бензалконію хлорид (*benzalkonii chloridum*) 0,04 мг у 1 мл (0,004%), динатрію едетат дигідрат (*dinatrii edetas dihydraz*), калію хлорид (*kalii chloridum*), магнію хлорид гексагідрат (*magnesium chloridum hexahydraz*), полісорбат 80 (*polysorbatum 80*), натрію тетраборат (*natrii tetraboras*), натрію гідроксид (*sodium*), вода для ін'єкцій (*aqua pro injectionibus*).

Властивості

ОКУфлеш® є спеціальним очним (ізотонічним, буферизованим) розчином, до складу якого входить екстракт очанки лікарської у якості добавки. Даний розчин призначений для закапування в очі чи для використання його в складі компресів для повік. Екстракт очанки лікарської виявляє по відношенню до очей протизапальну та в'яжучу дію. Ці властивості очанки лікарської вже давно використовуються для зниження втоми очей, а також для профілактики та підтримуючого лікування неінфекційних запальних захворювань повік і слизової оболонки очей (надалі - кон'юнктиви).

Рекомендації щодо застосування

ОКУфлеш® є ідеальним засобом для промивання очей. Даний препарат може використовуватися без консультації з офтальмологом як для простого короткочасного промивання ока, так і для закапування очей, чи в складі компресів для повік. Даний засіб використовується у випадку відчуття дискомфорту в оці, такого як печіння, поколювання, свербіж чи відчуття наявності в оці стороннього предмета. На практиці ОКУфлеш® є засобом для використання його в таких, наприклад, випадках:

- для промивання ока після проведення тонометрії та гоніоскопії.
- для промивання ока з метою видалення сторонніх тіл з кон'юнктиви: пилу, хлорованої води, тощо (за неефективності промивання негайно зверніться до лікаря!).
- при змиванні залишків флуоресцентних розчинів.
- при змиванні слизових і гнійних виділень.
- при промиванні очей після зняття контактних лінз.

У якості додаткового засобу при лікуванні деяких форм запалень кон'юнктиви, а також хронічних запалень слизової оболонки очей та повік.

При втомі очей, спричиненій тривалим читанням, керуванням автомо- білем, переглядом телепрограм чи користуванням комп'ютером.

У якості речовини для видалення з повік та вій косметичних засобів. ОКУфлеш® може використовуватися як дорослими, так і дітьми. Даний препарат можна використовувати при догляді за немовлятами та грудними дітьми; його можуть використовувати також вагітні жінки та матері, що годують.

Вказівки по застосуванню: після відкриття флакона препарат ОКУфлеш® є готовим до застосування за його призначенням. Пацієнту необхідно відкрити захисний ковпачок, дещо зрушити голівку флакона в зворотному напрямку, перевернути пластмасовий флакон та, злегка стиснувши його, выдавити до нижнього склепіння кон'юнктивального мішку ока необхідну кількість крапель. Препарат необхідно закапувати до хворого ока (чи використовувати препарат для промивання ока) у такій кількості, яка є необхідною в конкретній ситуації (кількість розчину, що виділяється контролюється силою стискання флакона). У випадку запалення повік препарат можна використовувати також для приготування компресів. Під час закапування ока необхідно стежити за тим, щоб дозуючий тубик не торкався до поверхні ока, повік чи вій. Нарешті, по закінченні використання препарату ковпачок необхідно щільно закрутити на його місце для того, щоб запобігти забрудненню препарату. Флакон необхідно зберігати у вертикальному положенні.

Протипоказання

ОКУфлеш® не можна застосовувати у випадку підвищеної чутливості до одного з компонентів.

Спосіб застосування та дози

При застосуванні для зняття подразнення кон'юнктиви, а також при підтримуючому лікуванні неінфекційних запалень слизової оболонки очей та повік, засіб необхідно закапувати в кон'юнктивальний мішок хворого ока (очей) по 1-2 краплі 3 - 4 рази на день. Для вимивання з кон'юнктиви стороннього тіла око необхідно обробляти розчином доти, доки стороннє тіло не буде видалене (доки не буде відчуватися полегшення).

Застереження

ОКУфлеш® не впливає на концентрацію уваги при керуванні транспортними засобами, при роботі з технологічним устаткуванням чи при роботі на висоті. Однак, після закапування до кон'юнктивального мішку у деяких випадках є можливим настання тимчасового зниження різкості візуального розпізнавання

предметів, тому будь-які дії, що вимагають підвищеної уваги, можуть здійснюватися лише після припинення цього тимчасового ефекту. У випадку ковтання необхідно звернутися до лікаря.

Пацієнтам не дозволяється носіння м'яких контактних лінз протягом застосування засобу. Тверді контактні лінзи перед застосуванням препарату необхідно зняти і лише через 20 хвилин після закапування можна користуватися ними знову.

Якщо під час застосування засобу ОКУфлеш® застосовуються також які-небудь інші очні краплі чи очні мазі, їх необхідно застосовувати як мінімум через 5 хвилин після застосування ОКУфлеш®.

Термін придатності

2 роки. Не можна використовувати після закінчення його терміну придатності, що є зазначеним на упаковці. Після розкриття флакона необхідно використати протягом 28 діб.

Умови зберігання

Зберігати при температурі, що не перевищує 25° С. Не охолоджувати/не заморожувати. Засіб ОКУфлеш® необхідно зберігати в місцях, до яких діти не мають доступу.

Упаковка

Каплі 10 мл во флаконі в картонній коробці.

Виробник

ТОВ "Унімед Фарма", Словацька Республіка.