

Склад

діюча речовина: 1 супозиторій містить: 387,10 мг стандартизованої суспензії культури бактерій (містить $6,6 \times 10^8$ E.coli, убитих і законсервованих у 6,6 мг зрідженого фенолу);

допоміжні речовини: твердий жир, олія рицинова поліетоксильована, гідрогенізована.

Лікарська форма

Супозиторії.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідні супозиторії, від білого до бежевого кольору, з характерним запахом фенолу.

Фармакотерапевтична група

Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування.
Код АТХ C05A X.

Фармакодинаміка

Препарат стимулює процеси місцевого імунітету за рахунок антигенної дії, спричиняючи як неспецифічну, так і специфічну імунні реакції, внаслідок чого підвищується місцевий імунний опір. Прискорює та покращує загоювання ран, має протизапальний ефект, попереджає реінфекцію та суперінфекцію.

Фармакокінетика

Внаслідок сорбції або трансцитозу компоненти суспензії культури бактерій діють як антигени та ініціюють процес місцевої імунізації, що, у свою чергу, спричиняє захисну імунну реакцію.

Показання

Місцеве лікування симптомів геморою.

Протипоказання

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

У випадку грибкових інфекцій необхідно одночасно застосовувати місцевий протигрибковий лікарський засіб.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Дані відсутні.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Для застосування препарату у період вагітності або годування груддю протипоказань немає.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням необхідно здійснити гігієнічні процедури анальної ділянки. Застосовувати ректально, дорослим по 1 супозиторію 2 рази на добу (зранку та ввечері), по можливості після дефекації.

Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай термін застосування становить 5–7 днів.

Діти

Не застосовувати дітям.

Передозування

Про випадки передозування або інтоксикації не повідомлялося. У разі випадкового перорального введення супозиторіїв (наприклад, дітьми) можливі розлади шлунково-кишкового тракту (біль у животі, нудота).

Побічні реакції

В окремих випадках у хворих із підвищеною чутливістю до компонентів супозиторіїв Постеризан можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, включаючи свербіж і печіння.

Може спричиняти контактний дерматит (наприклад, через гіперчутливість до фенолу).

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.

Упаковка

По 5 супозиторіїв у стрипі.

По 2 стрипи в картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Др. Каде Фармацевтична фабрика ГмбХ.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Рігіштрассе, 2, 12277 Берлін, Німеччина.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).