

Склад

Сукральфат, какао-масло, ланолін (рослинного походження), Вітепсол W25 (основа для супозиторіїв), екстракт календулі, екстракт ромашки, екстракт гамамелісу.

Показання

Репарон Гербал, ректальні супозиторії, призначені для полегшення симптомів геморою та пов'язаних з ним ускладнень (таких як екзема, тріщини прямої кишки). Вони обволікають і захищають епідермальну (зовнішню) кулю шкіри, захищають запалену, сверблячу шкіру і таким чином сприяють її регенерації. Репарон Гербал зменшує сухість шкіри, сприяє загоєнню ран, знижує ризик утворення тріщин та пошкоджень, зумовлених дефекацією.

Протипоказання

Не використовуйте супозиторії, якщо маєте алергію на ланолін або інші допоміжні речовини цього медичного виробу.

Не використовуйте при гемороїдальній кровотечі.

Застереження

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Слід уникати попадання у вічі!

Чи не ковтати!

Репарон Гербал, ректальні супозиторії, не призначені для вагінального застосування.

Призначений тільки для ректального застосування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дані про взаємодію супозиторіїв ректальних Репарон Гербал з іншими лікарськими засобами відсутні, тому до початку застосування медичного виробу Репарон Гербал спільно з іншими препаратами для ректального застосування рекомендується проконсультуватися з лікарем, який Вас лікує, або фармацевтом.

Одночасне застосування супозиторіїв ректальних та презервативів може знизити ефективність контрацепції.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Медицинское изделие Репарон Гербал, суппозитории ректальные, не противопоказаны при беременности и в период кормления грудью, но в этих случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом, который Вас лечит.

Спосіб застосування та дози

Завжди використовуйте медичний виріб відповідно до інструкції із застосування.

При застосуванні, яке відрізняється від описаного в інструкції, покращення стану може не статися або може виникнути подразнення.

Перед застосуванням ректальних супозиторіїв вимийте руки.

Рекомендована доза: 1-2 рази на день; вводити 1 супозиторій Репарон Гербал у пряму кишку, якщо можливо - після прийняття сидячої ванни.

Перед використанням переконайтеся, що упаковка не розкрита та медичний виріб не пошкоджено. Не використовуйте супозиторії, якщо упаковка пошкоджена.

Кожен blister має осередки із супозиторіями, які розділені перфораціями.

Відірвіть один осередок по лінії перфорації стрічки блистера. Обережно розкрийте комірку, відокремивши верхню частину від нижньої. Дістаньте супозиторій з комірки.

Завжди мийте руки після використання ректальних супозиторіїв.

Не допускайте потрапляння медичного виробу Репарон Гербал в очі або на шкіру навколо очей, в рот або слизові оболонки ротової порожнини. Якщо речовина медичного виробу потрапить на ці ділянки, зітріть або змийте її. При застосуванні ректальних супозиторіїв рекомендується використання гігієнічних прокладок.

Тривалість застосування супозиторіїв залежить від швидкості поліпшення стану. Можливе застосування без перерви протягом 4 тижнів.

Зверніться до лікаря, якщо симптоми захворювання не зменшуються протягом 1-2 тижнів.

Побічні реакції

Застосування будь-якого засобу місцевого застосування - особливо при тривалому застосуванні - може викликати алергічні реакції, до симптомів яких відносяться: відчуття печіння, свербіж, болючість, почервоніння. У разі розвитку таких симптомів при застосуванні цього медичного виробу необхідно припинити застосування супозиторіїв та звернутися до лікаря.

Якщо ви помітите будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, необхідно повідомити про це вашого лікаря або фармацевта.

Термін придатності

Термін придатності вказаний на упаковці та на блістері.

Не використовуйте медичний виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Датою закінчення терміну придатності вважається останній день зазначеного місяця.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C.

Зберігати у захищеному від світла місці.

Медичні вироби не слід викидати до побутових відходів або стічних вод. Якщо необхідно утилізувати виріб, який більше не потрібний - проконсультуйтеся з фармацевтом. Ці заходи допоможуть запобігти забрудненню навколишнього середовища.

Упаковка

По 10 супозиторіїв у картонній упаковці.

Виробник

ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

9900, м. Керменд, вул. Матяш Кіра 65, Угорщина