

Склад

діюча речовина: 1 флакон містить екстракту рідкого з трави водяного перцю (*Herba Polygoni hydropiperis*) (1:1) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл;

допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма

Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина зеленувато-бурого кольору, має духмяний запах.

Фармакотерапевтична група

Гемостатичний, кровоспинний засіб рослинного походження. Код АТХ B02B X.

Фармакодинаміка

Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамнозин, кемпоферол, мірицетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, оберігають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіною кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Дубильні речовини проявляють протизапальну і в'язучу дію, спричиняють синергічний ефект з біофлавоноїдами щодо кровоспинної дії.

Фармакокінетика

Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70 % етиловим спиртом. При даній концентрації в ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон), так і в зв'язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють через мікроворсинки шлунково-кишкового тракту у кров. Після проходження окисно-відновних реакцій з участю флавоноїдів вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Аглікон виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окиснюється в циклі Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.

Показання

Як допоміжний засіб застосовувати в акушерсько-гінекологічній практиці при маткових післяпологових кровотечах, при субінволюції матки, гіперменорагії. Крім того, застосовувати при кровотечах із дрібних судин шлунка, кишечника, при несильних гемороїдальних кровотечах.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

На даний час взаємодія з іншими лікарськими препаратами не виявлена.

Особливості застосування

У процесі зберігання лікарського засобу допускається випадання осаду. Не застосовувати разом з молочними продуктами для запобігання утворенню комплексів (хелатних), що не всмоктуються.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати «Перцю водяного екстракт» під час керування автомобілем та проведення робіт із застосуванням потенційно небезпечних механічних пристроїв.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Питання про призначення препарату у період вагітності або годування груддю вирішується індивідуально з урахуванням співвідношення користі/ризиків.

Спосіб застосування та дози

«Перцю водяного екстракт» дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 30–40 крапель 3–4 рази на добу (за 30 хв до їди). Курс лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії.

Діти

Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Передозування

У разі перевищення дози лікування симптоматичне.

Побічні реакції

Головний біль, нудота, блювання, запаморочення; у поодиноких випадках можливі алергічні реакції, в тому числі шкірний висип, почервоніння, свербіж.

Термін придатності

3 роки 6 місяців.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл у флаконі-крапельниці у пачці або без пачки.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).