

Склад

в г / 100 г:

діюча речовина: вода Адріатичного моря - 25 м

допоміжні речовини: декспантенол 75 L (не менше 75% декспантенола) * - 1,33 г;

вода очищена - 73,67 м

* Декспантенол 75L - водний розчин, що містить не менше 75% (R) -пантенола, стабілізованого приблизно 1% D-пантолактон.

Не містить консервантів.

Присутність іонів:

Na + - хв. 1,90 мг / мл;

Ca²⁺ + - хв. 0,06 мг / мл;

Mg²⁺ + - хв. 0,25 мг / мл;

Cl⁻ - хв. 4,10 мг / мл;

SO₄²⁻ - хв. 0,45 мг / мл;

HCO₃⁻ - хв. 0,025 мг / мл.

Опис

Безбарвний прозорий розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група

Протівоконгестивний засіб.

КОД АТС R01AX10.

Фармакодинаміка

Аква Маріс® Плюс є стерильний ізотонічний розчин, що містить в своєму складі морську воду і декспантенол.

Декспантенол - похідне пантотенової кислоти. Пантотенова кислота - водорозчинний вітамін комплексу В - є складовою частиною коферменту А.

Декспантенол стимулює регенерацію слизової оболонки, нормалізує клітинний метаболізм, надає регенеруючу і слабку протизапальну дію. При уприскуванні в порожнину носа Аква Маріс® Плюс зволожує слизову оболонку, стимулює регенерацію і спричиняє трофічну дію на клітини слизової оболонки порожнини носа. Препарат сприяє розрідженню слизу і нормалізації її вироблення в келихоподібних клітинах слизової оболонки носової порожнини. Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, що

посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до впровадження хвороботворних бактерій і вірусів.

Показання

Аква Маріс® Плюс показаний:

- для лікування і профілактики атрофічних і субатрофічних ринітів;
- для очищення та зволоження слизової оболонки носа при запальних захворюваннях порожнини носа, носових пазух і носоглотки, в тому числі вагітним жінкам і в період лактації;
- в комплексній терапії алергічних і вазомоторних ринітів (особливо особам, схильним або страждають підвищеною чутливістю до лікарських препаратів, в тому числі вагітним жінкам і в період лактації);
- для профілактики інфекцій порожнини носа в осінньо-зимовий період (в тому числі вагітним жінкам і в період лактації);
- пацієнтам, що страждають сухістю слизової оболонки порожнини носа та особам, які живуть і працюють в приміщеннях з кондиціонованим повітрям і / або центральним опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки порожнини носа в змінених мікрокліматичних умовах;
- людям, слизова оболонка верхніх дихальних шляхів яких постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють в гарячих і запилених цехах, а також знаходяться в регіонах з суворими кліматичними умовами);
- людям похилого віку для профілактики вікових атрофічних змін слизової носа.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Так як препарат не чинить системного впливу на організм, взаємодії з іншими лікарськими препаратами не відмічено. Можливе застосування з іншими лікарськими засобами, використовуваними для лікування нежиті.

Особливості застосування

Не рекомендується застосовувати на вулиці в холодну пору року, не рекомендується виходити з теплого приміщення на вулицю відразу після

застосування препарату в холодну пору року.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами і механізмами.

Спосіб застосування та дози

З лікувальною метою:

- дітям з 1 року до 7 років: 4 рази в день по два сприскування в кожную ніздрю;
- дітям з 7 до 16 років: 4-6 разів на день по два впорскування в кожную ніздрю;
- дітям з 16 років і дорослим: 4-8 разів на день по два - три сприскування в кожную ніздрю.

Курс лікування у всіх випадках становить 2-4 тижні (на розсуд лікаря).

Рекомендується повторити курс через місяць.

З профілактичною метою:

- дітям з 1 року до 7 років: 1-3 рази на день по одному - двом сприскування в кожную ніздрю;
- дітям з 7 до 16 років: 2-4 разів на день по два впорскування в кожную ніздрю;
- дітям з 16 років і дорослим: 3-6 разів на день по два - три сприскування в кожную ніздрю.

Діти

С 1 року.

Передозування

Випадки передозування не відмічені.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Спрей назальний.

По 30 мл препарата в скляному флаконі темного кольору, оснащеному розпилювальним пристроєм і захисною кришкою з пропилена. Один флакон разом з інструкцією по застосуванню поміщають в картонну коробку.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Свилно 20, 51000 Риека, Хорватія.