

Склад

Активні інгредієнти: глюкоза зневоднена, цитрат натрію, хлорид натрію, калію хлорид.

допоміжні речовини: ароматизатор полуниці.

Властивості

Розчинний регідратант.

Перша лінія при лікуванні гострої діареї (згідно з рекомендаціями ВООЗ, UNICEF та ESPGHAN)

EASYSalt – ефективна профілактика зневоднення:

- збалансований та адекватний склад;
- легкий та зручний у використанні;
- приємний смак (полуничний смак).

Зручна порційна форма прийому.

Можна розчинити в 1 склянці кип'яченої або пляшеної води (прямо у пляшці).

Рідка форма = швидкий ефект

Діє швидше за таблетки.

Своєчасний початок регідrataції дозволить швидко зупинити діарею та відновити енергію, усунути інші симптоми зневоднення та суттєво покращити самопочуття.

Пероральна регідrataція – єдиний спосіб компенсації втрачених електролітів та рідини. Своєчасна та адекватна регідrataція допоможе уникнути розвитку ускладнень.

Рекомендації щодо застосування

- Гостра діарея;
- блювання;
- підвищена температура;
- інтенсивні фізичні навантаження;
- зневоднення;
- опіки.

Європейська асоціація гастроентерологів рекомендує обов'язкову оральну регідrataцію як першу лінію лікування гострої діареї.

Застереження

Індивідуальна нестерпність до компонентів. Продукт не призначений для вживання особам із порушенням функції нирок, алкалозом, порушеннями свідомості та всмоктуванням вуглеводів. Якщо протягом 24 годин після початку використання стан не покращиться, зверніться до лікаря. Зверніть увагу, що маленькі діти особливо схильні до зневоднення! Продукт не призначений для парентерального застосування. При зневодненні середнього та тяжкого ступеня необхідно звернутися до лікаря.

Спосіб застосування та дози

Содержимое 1 саше развести в 200 мл воды комнатной температуры.

Принимать взрослым по следующей схеме:

В первые 4-6 часов с момента возникновения первых симптомов (период первичной (активной) регідrataции): по 50-100 мл/кг массы тела. Употреблять небольшими порциями в течение 4 часов.

Поддерживающая регідrataция: развести 1 саше в 200 мл воды. Принимать по необходимости и/или после каждого приступа рвоты и/или диареи.

Не добавлять в сок, чай или молоко.

Рвота не является противопоказанием к применению и обычно проходит во время употребления.

Количество жидкости, которую следует употреблять, зависит от степени обезвоживания и массы тела.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Упаковка

10 саше у картонній коробці.

Виробник

ПП "Євро-Плюс", Україна.