

Склад

основні речовини: таурин - 130 мг, бурштинова кислота - 65 мг;

допоміжні речовини: діоксид кремнію, декстроза, підсолоджувач (аспартам), лимонна кислота кристалічна безводна, гідрокарбонат натрію, полівінілпіролідон 30, поліетиленгліколь.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело таурину, бурштинової кислоти і діоксиду кремнію. Використовується для профілактики алкогольної інтоксикації і полегшення похмільного синдрому за рахунок поліпшення роботи печінки, зв'язування і виведення з організму токсичних продуктів метаболізму алкоголю.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки в стадії загострення, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, шлункові і кишкові кровотечі, кишкова непрохідність, фенілкетонурія.

Запобіжні заходи

Містить джерело фенілаланіну. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Перед прийомом 1-2 таблетки розчинити у склянці (200 мл) питної води:

- з метою зниження проявів алкогольної інтоксикації і профілактики сп'яніння: приймати дорослим по 1 таблетці за 1 годину до прийому алкоголю або відразу після цього;
- з метою швидкого усунення симптомів похмілля: приймати дорослим по 1-2 таблетки вранці.

Термін придатності

3 роки.