

Склад

Активні інгредієнти:

- Гліцин - 50,0 мг;
- Вітамін С - 15,0 мг;
- Вітамін В6 - 0,4 мг;
- Вітамін В1 - 0,3 мг.

Допоміжні речовини: декстроза, натуральний ароматизатор «апельсиновий», магнієві солі жирних кислот Е470.

Лікарська форма

Дієтична добавка. Комплекс гліцину з вітамінами.

Фармакологічні властивості

Гліцин

Замісна амінокислота, виробляється в організмі людини і постійно витрачається. Гліцин грає важливу роль в синтезі нуклеїнових, жовчних та інших есенціальних амінокислот в організмі. Гліцин необхідний для діяльності центральної нервової системи. Він виконує функцію інгібіторного нейротрансмітера, є регулятором метаболічних процесів у центральній нервовій системі, зменшує психоемоційне напруження, здійснює нейропротекторну, антистресову, седативну дію, покращує метаболізм мозку, нормалізує сон. Завдяки гліцину мозок здатний витримувати підвищені розумові навантаження, він повертає працездатність мозку і сприяє поліпшенню пам'яті у дітей. Гліцин підвищує концентрацію уваги, позбавляє від швидкої і частою стомлюваності. Завдяки своїм властивостям гліцин рекомендований для дітей дошкільного та шкільного віку.

Вітамін С

Володіє антиоксидантними властивостями, підвищує захисні сили дитячого організму і показники імунітету.

Вітамін В1

Необхідний для обміну речовин в організмі, підтримує хороше самопочуття, знімає втоми, дратівливість, нервозність. Корисний при порушеннях діяльності мозку і проблемах із засвоєнням інформації.

Вітамін В6

Бере участь у багатьох біохімічних реакціях, необхідних для підтримки життєво важливих процесів організму дитини, зростає. Сприяє нормалізації роботи нервової системи.

Показання

Може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування дітей, як додаткове джерело гліцину і вітамінів, що сприяють зменшенню психоемоційної напруги і стресу, підвищенню розумової працездатності та нормалізації сну у дітей і підлітків. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів препарату.

Особливості застосування

Дана продукція не є препаратом медичного призначення.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 3-х до 7 років по 1 жувальній таблетці 1 раз на добу, дітям старше 7 років по 1 жувальній таблетці 2 рази на добу під час або після їди. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Рекомендований термін споживання: 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

До уваги хворих на цукровий діабет: 1 жувальна таблетка містить 9кДж / 2 ккал і 0,04 хлібних одиниць.

Діти

Застосовувати дітям з 3 років.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 60 жувальних таблеток у флаконі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Німеччина.