

Склад

1 таблетка (610 мг) містить активні інгредієнти:

склад 1 таблетки	кількість в 1 таблетці	%RI* на таблетку	кількість на 100г	%RI* на 100 г
Вітамін С	110 мг	138%	18042 мг	22635%
Нікотинамід (NE)1	15 мг	94%	2460 мг	15418%
Вітамін Е (α- TE)2	13 мг	108%	2132 мг	17714%
Пантотенова кислота	6 мг	100%	984 мг	16402%
Вітамін В6	1,9 мг	136%	312 мг	22307%
Вітамін В2	1,6 мг	114%	262 мг	18698%
Вітамін В1	1,2 мг	109%	197 мг	17878%
Фолати	400 мкг	200%	65608 мкг	32804%
• Фолієва кислота	200 мкг	100%	32804 мкг	16402%
• Кальцій-L- Метилфолат	208 мкг (еквівалентно 200 мкг фолієвої кислоти)	100%	34116 мкг	16402%
Йод Біотин	150 мкг	100%	24603 мкг	16402%

Вітамін В12	60 мкг	120%	9841 мкг	19682%
	3,5 мкг	140%	574 мкг	22963%

* відсоток від рекомендованої добової дози згідно Регламенту ЄС № 1169/2011

1 Еквівалент ніацину

2 Еквівалент RRR-альфа-токоферолу інгредієнти: *Наповнювач*: Мікрокристалічна целюлоза; Кальцій-L-аскорбінова кислота (Вітамін С); D, L-альфа токоферолу ацетат (Вітамін Е) (Мальтодекстрин, Модифікований крохмаль); *Наповнювач*: Гідроксипропілцелюлоза; Нікотинамід; Глазирувачі: Гідроксипропілцелюлоза, Гідроксипропілметилцелюлоза; Кальцій-D-пантотенат; D-Біотин (Мальтодекстрин); Барвник: Титану діоксид; Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Мальтодекстрин); Агент, що протидіє злипанню: Магнієві солі жирних кислот; Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6); Рибофлавін (Вітамін В2); Тіаміну мононітрат (Вітамін В1); Зволожувач: Гліцерин; Кальцій-L-Метилфолат (МЕТАФОЛИН®/ Metafolin®); Фолієва кислота; Калій йодид; Барвник: Заліза

оксид.

Поживна цінність на 1 таблетку: Енергетична цінність 4 кДж/1 ккал Жири < 0.5 г , у т.ч. насичені < 0,1 г , Вуглеводи < 0.5 г.

Опис

ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР І - це дієтична добавка для жінок, які планують вагітність та вагітним до кінця 12 тижня

ФОЛІЄВА КИСЛОТА + МЕТАФОЛИН®

Вітаміни та йод

Сучасні жінки часто харчуються нерегулярно і використовують різні дієти. Це призводить до того, що їх організм не отримує всіх необхідних вітамінів і мінералів. Напружена робота і прийом пероральної контрацепції можуть призводити до нестачі вітамінів з групи В та фолієвої кислоти.

Спосіб харчування жінки до вагітності, та під час вагітності особливо важливий, так як він впливає на здоров'я як матері, так і плоду. Складові компоненти дієтичної добавки ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР І зміцнюють організм жінки і збагачують щоденну дієту вітамінами і мінеральними речовинами. Дієтична добавка ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР І - це комплекс 10 вітамінів і йоду.

Склад препарату був розроблений для жінок, які планують вагітність, та вагітних зі строком вагітності до кінця 12 тижня. Підібрані належним чином компоненти дієтичної добавки ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР І забезпечують основну порцію вітамінно-мінеральних добавок до щоденного раціону. Збільшена доза фолієвої кислоти в дієтичній добавці ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР І необхідна для регулювання різних метаболічних процесів.

Дієтична добавка Фемібіон® Наталкер І містить фолієву кислоту та МЕТАФОЛИН®. В організмі фолієва кислота перетворюється в біологічно активну форму. Медичні дані свідчать, що організм кожної другої жінки не може повністю перетворити фолієву кислоту в її активну форму. МЕТАФОЛИН® - це біологічно активна форма фолатів, що легко засвоюється. Завдяки цьому МЕТАФОЛИН® для організму більш доступний і засвоюється краще, ніж фолієва кислота. Фемібіон® Наталкер І містить фолієву кислоту та МЕТАФОЛИН® для забезпечення необхідного рівня фолатів в організмі вагітної жінки, навіть у тих жінок, організм яких не може повністю перетворити, і як наслідок, засвоїти фолієву кислоту.

Прийом фолієвої кислоти та її активної форми МЕТАФОЛИН®, жінкам, які планують вагітність, рекомендується починати мінімум за 6 тижнів, і продовжувати до кінця другого триместру вагітності. У годуючих грудьми жінок потреба в фолієвій кислоті вище. Після чотирьох місяців дефіциту фолієвої кислоти в дієті спостерігається виснаження її запасів в організмі.

Під час вагітності збільшується потреба у йоді, в основному в першому триместрі, до близько 200 мікрограмів на добу. Йод проникає також у грудне молоко матері, збільшуючи його втрату з організму. Правильне добове споживання йоду необхідно забезпечити прийомом препаратів йодистого калію в кількості 150 мкг для вагітних і годуючих грудьми.

Рекомендації до споживання: може бути включена до складу раціонів дієтичного харчування, рекомендованих лікарем, з метою оптимізації хімічного складу раціону як додаткове джерело фолієвої кислоти, вітамінів В1, В2, В6, В12, С, Е, біотину, нікотинамід, пантотенової кислоти, йоду.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Містить мальтодекстрин. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Не вживати пацієнтам з проявами гіпертиреозу, глюкозо-галактозної мальабсорбції та сахарозо-ізомальтазного дефіциту. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Спосіб застосування та дози

Жінкам по 1 таблетці на день під час основного прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Термін вживання: рекомендовано для плануючих вагітність, та вагітним до кінця дванадцятого тижня, споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Термін придатності

2 роки.