

Склад

30 таблеток вкритих гастрорезистентною оболонкою

1 ТАБЛЕТКА МАСОЮ 1040 мг МІСТИТЬ: Заліза глюконат 350 mg (мг) Вітамін С 60 mg (мг) Фолієва кислота 400 mcg (мкг) Вітамін В12 30 mcg (мкг) СКЛАД: мальтодекстрин, заліза глюконат, мікрокристалічна целюлоза, кроскармелоза натрію, вітамін С (аскорбінова кислота, етилцелюлоза), оболонка (етилцелюлоза, тригліцериди середнього ланцюга, олеїнова кислота, гідрохлорид амонія, натрію альгінат, гідроксипропілметилцелюлоза), кремнію діоксид, магнію стеарат, стеаринова кислота, гліцерин, фолієва кислота, вітамін В12.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) І ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) НА 100 g (г): білки - 2.8 g (г), вуглеводи - 32.25 g (г), жири - 3.2 g (г); 687.5 kJ (кДж)/164.45 kcal (ккал).

НА 1 ТАБЛЕТКУ: білки - 0.027 g (г), вуглеводи - 3.4 g (г), жири - 0.032 g (г); 7 kJ (кДж)/1.67 kcal (ккал).

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування як джерело вітамінів, біологічно активних речовин з метою загального зміцнення організму і створення оптимальних дієтологічних умов функціонування нервової, кровотворної системи для стимуляції гемопоезу та профілактики дефіциту заліза і вітамінів. Профілактика латентного дефіциту заліза (ЛДЗ) та клінічно вираженого дефіциту заліза, дефіциту заліза і фолієвої кислоти у період до вагітності, під час вагітності та у період годування груддю.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість препарату та підвищена чутливість до окремих його компонентів. Гемолітична анемія, гемосидероз, гемохроматоз, апластична анемія.

Особливості застосування

В період вагітності та годування груддю, дітям застосування препарату можливе. Дуже рідко можуть спостерігатися нудота, блювання, біль в обл. шлунка, запори або діарея.

Спосіб застосування та дози

При лікуванні - 1 таблетка 2 рази на добу; профілактика - 1 таблетка 1 раз на добу, в період лактації по 1 таблетці 1 раз на добу протягом всього періоду. Курс лікування: до нормалізації рівня Нв з подальшим прийомом 1 таблетки на день протягом 1-3 міс. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ РЕКОМЕНДОВАНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

В картонній упаковці 2 блістери по 15 таблеток.