

Склад

1 таблетка містить: активні інгредієнти: екстракт трави грициків звичайних – 200 мг (mg), екстракт кори калини – 150 мг (mg), рутин (рутозид) – 50 мг (mg);

допоміжні речовини: наповнювачі: целлактоза-80, натрію кроскармелоза, магнію стеарат;

оболонка таблетки: суха суміш для покриття: гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь, титану двоокис, рибофлавін, оксид заліза червоний.

Лікарська форма

Добавка дієтична на основі рослинної сировини

Фармакологічні властивості

Добавка містить комбінацію натуральних рослинних екстрактів та рутину, які сприяють нормалізації перебігу менструації.

Екстракт трави грициків містить флавоноїди (кверцетин, діосмін, гесперидин тощо), амінокислоти, сапоніни, вітамін С, каротиноїди та інші речовини, завдяки чому проявляє кровоспинні властивості; сприяє покращенню перистальтики кишечника; застосовується при атонії матки, маткових кровотечах, тривалих і рясних місячних, в тому числі, в передменопаузальний період.

Екстракт кори калини містить вітаміни (С, К, каротини), флавоновий глікозид вібурнін і дубильні речовини, які зумовлюють кровоспинні, а також слабкі сечогінні властивості, завдяки чому кора калини застосовується при дисменореї (болісних менструаціях).

Рутин сприяє зменшенню проникності і ламкості стінок капілярів, завдяки чому може позитивно впливати на еластичність судин, сприяти зменшенню крововтрати, забезпечувати ангіопротекторні властивості, чинить

ранозагоювальну і протизапальну дії.

Показання

Рекомендується вживати як додаткове джерело вітамінів (К, С, бета-каротину, рутину), дубильних речовин, флавоноїдів (вібурніну) з метою нормалізації функціонального стану жіночих репродуктивних органів при менорагіях (рясних менструаціях).

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації, порушення в системі згортання крові, тромбофлебіти, схильність до тромбозів.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Додатку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовувати протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим (жінкам) по 1 таблетці 2 рази на добу незалежно від прийому їжі; запивати достатньою кількістю питної води. Рекомендовано починати застосування за 3-7 днів до початку менструації та продовжувати до її завершення. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці за температури від 0 °C до 25 °C.

Упаковка

По 10 таблеток в блістері, по 3 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ «Київмедпрепарат».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.