

Склад

1 капсула містить:

олія насіння гарбуза (*Cucurbita pepo oil*) — 428,5 мг,

β-ситостерол — 60 мг,

сухі рослинні екстракти:

коріння ехінацеї (*Echinacea pallida*) — 20 мг,

коріння кропиви (*Urtica dioica*, *Urtica urens*) — 100 мг,

листя яванського чаю (*Orthosiphon stamineus*) — 50 мг,

фрукти пальми сереноа (*Serenoa repens*) — 2,5 мг;

магній — 38 мг (10%*),

цинк — 4 мг (40%*),

вітамін Е — 10 мг (83%*).

*Відносно середніх референсних величин добового споживання для осіб віком старше 18 років (400 КДж/2000 кал).

Рекомендації по вживанню

Може бути рекомендована для включення в раціони харчування чоловіків як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, бета-ситостеролу, магнію, цинку та вітаміну Е. Збалансоване поєднання складових сприяє підтримці нормального функціонування передміхурової залози і сечовидільної системи та захисту від окисного пошкодження.

Гарбузова олія, пальма сереноа сприяють підтриманню нормального функціонального стану передміхурової залози та сечовиділення.

Кропива містить каротиноїди, дубильні речовини, ситостерини, які сприяють пригніченню синтезу дигідротестостерону, що важливо для підтримання здоров'я передміхурової залози.

Ехінацея підтримує імунну систему.

Яванський чай допомагає вивести зайву рідину з організму.

Вітаміни та мінерали мають антиоксидантні властивості та беруть участь у метаболізмі передміхурової залози. Зокрема, цинк сприяє нормальній здатності до запліднення та репродуктивній функції.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза

Дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу бажано через 1 год після прийому їжі з невеликою кількістю води. Тривалість вживання — до 12 тиж; в подальшому тривалість вживання узгоджувати з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, період вагітності та годування груддю.

Особливості застосування

Дієтична добавка Гентос Форте не призначена для лікування.

Дієтичну добавку Гентос Форте не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед споживанням рекомендується консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.