

Склад

1 флакон 40 ml (мл) містить діючі речовини: бактеріальний компонент (*Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus megaterium*) - 1×10^6 КУО / ml (мл), комплекс ферментів бактерій роду *Bacillus*;

допоміжні речовини: вода очищена, диметикон, феноксіетанол, 1,2-бензізотіазолін-3-он, віддушка.

Лікарська форма

Спрей для горла.

Показання

Біоплазмікс спрей для горла сприяє конкурентному витісненню небажаних бактерій, вірусів, грибів, тому рекомендований як допоміжний засіб при бактеріальних, вірусних і грибкових інфекціях порожнини рота і горла (при пошкодженні слизової горла, хронічному тонзиліті, фарингіті, ларингіті), першими проявами яких можуть бути відчуття першіння і роздратування в горлі.

Може бути рекомендований людям, що зазнають дискомфорт в горлі, пов'язаний з порушенням балансу мікрофлори, викликаний дією несприятливих зовнішніх чинників (вдихання диму або дратівливих речовин). З метою відновлення балансу мікрофлори ротової порожнини може застосовуватися при хворобах зубів і ясен; після місцевого та / або системного застосування антибіотиків.

Протипоказання

Не використовуйте при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів засобу.

Не застосовувати дітям до 3-х років, жінкам у період вагітності і лактації, особам з імунодефіцитами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Добре збовтати перед використанням. Для правильного використання Біоплазмікс спреї для горла потрібно зняти захисний ковпачок, тримаючи флакон вертикально, направити розпилювач в ротову порожнину, натиснути двома пальцями на підставу розпилювача і впорснути. Очистити розпилювач і встановити захисний ковпачок-розпилювач.

Дітям від 3-х років та дорослим застосовувати по 2-3 вприскування 3-4 рази на добу протягом 10-14 днів. Після застосування спрею не слід пити і приймати їжу протягом 30 хвилин. Якщо симптоми зберігаються більше 7 днів або посилюються при застосуванні виробу, слід проконсультуватися з лікарем.

Діти

Дітям з 3-х років.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 мл у флаконі в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ГЕЛІНГХЕМ СПП, Німеччина.