

Склад

діюча речовина: листя евкаліпта;

1 флакон містить: настойки листя евкаліпта (*Eucalypti folii tinctura*) (1:5)
(екстрагент – етанол 70 % (об/об)) – 25 мл.

Лікарська форма

Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинаміка

Евкаліпта настойка містить дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні щодо грампозитивних, грамнегативних мікроорганізмів, які пригнічують ріст грибів та найпростіших. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Евкаліпта настойка чинить антисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, яка зумовлена окислювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпену і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу. Препарат виявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

Показання

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату. Бронхіальна астма, бронхоспазм, запальні захворювання травного тракту та жовчовивідних шляхів, захворювання печінки з тяжким перебігом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

Особливості застосування

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Евкаліпт, настойку, під час керування автомобілем або роботи з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю препарат протипоказаний.

Спосіб застосування та дози

Евкаліпт, настойку, приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання горла та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15-30 крапель настойки 3-4 рази на добу після їди. Дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на добу після їди.

Для полоскання розвести 10-15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

У разі відсутності пробки-крапельниці для застосування лікарського засобу, закупореного пробкою закупорювальною, використовувати скляну піпетку медичну, при цьому доза застосування не зміниться.

Парові інгаляції проводять за допомогою інгаляторів будь-якого типу, використовуючи Евкаліпт настойку у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем.

Діти

Препарат застосовують дітям віком від 12 років за призначенням та під наглядом лікаря.

Передозування

Не визначалося.

Побічні реакції

При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (кропив'янка, гіперемія, висипи на шкірі, набряк Квінке, свербіж); іноді – контактний дерматит (у ділянці губ); нудота, блювання і діарея. При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).