

Склад

діючі речовини: 10 мл сиропу містять: екстракту адхатоди судинної листя густого (*Adhatoda vasica*) (5:1), (екстрагент вода очищена) – 120 мг; екстракту солодки голої коренів густого (*Glycyrrhiza glabra*) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) – 18 мг; екстракту перцю довгого плодів густого (*Piper longum*) (4:1), (екстрагент вода очищена) – 25 мг; екстракту фіалки запашної квіток густого (*Viola odorata*) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) – 6 мг; екстракту іссопу лікарського листя густого (*Hyssopus officinalis*) (4,17:1), (екстрагент вода) – 12 мг; екстракту калгану великого коренів густого (*Alpinia galanga*) (4,17:1), (екстрагент вода очищена) – 12 мг; екстракту екстракту кордії широколистої плодів густого (*Cordia latifolia*) (4:1), (екстрагент вода очищена) – 25 мг; екстракту алтеї лікарської насіння густого (*Althaea officinalis*) (4:1), (екстрагент вода очищена) – 25 мг; екстракту зизифусу звичайного плодів густого (*Zyzyphus vulgaris*) (4:1), (екстрагент вода очищена) – 25 мг; екстракту оносми приквіткової листя густого (*Onosma bracteatum*) (4:1), (екстрагент вода очищена) – 25 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь, сахарин натрію, сорбіту розчин (Е 420), гліцерин, кислота лимонна безводна, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), олія м'яти перцевої, олія гвоздики, вода очищена.

Лікарська форма

Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: сироп коричневого кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Комбіновані препарати, що застосовуються при застудних захворюваннях.

Код АТХ R05X.

Фармакодинаміка

Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Активує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, змінює поверхнево активні властивості легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та поліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує відходження слизу

дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик.

Прийом препарату знижує тонус гладеньких м'язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю відзначається через 3-4 дні прийому препарату.

Показання

Комплексна терапія запальних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів, що супроводжуються сухим подразнювальним кашлем; бронхіт (гострий та хронічний); фарингіт, трахеїт, трахеобронхіт.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступень ожиріння.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується одночасний прийом препарату з протикашльовими засобами, що зменшують відходження мокротиння (наприклад, кодеїн).

При необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості застосування

Сироп не містить цукру, тому його можна застосовувати хворим на цукровий діабет та пацієнтам, які перебувають на гіпокалорійній дієті. До складу препарату входить розчин сорбіту, застосування якого може чинити м'яку послаблювальну дію. Енергетична цінність 1 г сорбіту – 2,6 ккал. Застосування пропіленгліколю 400 мг/кг (для дорослих), 200 мг/кг (для дітей) може спричинити симптоми, схожі з такими, що виникають при вживанні алкоголю.

Експериментальні та клінічні дослідження свідчать про нешкідливість застосування препарату Лінкас без цукру пацієнтам літнього віку.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосовувати у період вагітності або годування груддю протипоказано, оскільки солодки голої корені що входять до складу лікарського засобу, підвищують рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. У разі необхідності прийому препарату під час годування груддю, годування груддю слід припинити.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати внутрішньо.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3-4 рази на добу;

дітям віком від 7 до 11 років – по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 4 рази на добу;

дітям віком від 3 до 6 років – по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3 рази на добу;

дітям віком від 1 до 2 років – по ½ чайній ложці (2,5 мл) 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування – 3 до 7 днів.

Діти

Дітям віком до 1 року препарат не призначати.

Передозування

Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні реакції

При застосуванні препарату можливі слабкість, підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, гіперемія шкіри, анулярна еритема, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк); посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С .

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Сироп по 120 мл у флаконі № 1, у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).