

Склад

діючі речовини: Lactobacillus acidophilus 3×10^6 , Lactobacillus crispatus 5×10^6 , Lactobacillus rhamnosus 5×10^6 , Lactobacillus vaginalis 5×10^6 , молочна кислота 100 mg (мг).

допоміжні речовини: гідрогенізовані тригліцериди, віск бджолиний.

Лікарська форма

Супозиторії вагінальні.

Фармакологічні властивості

Бактерії, що входять до складу засобу, являють собою живі лактобацили, які часто зустрічаються в нормальній мікрофлорі і ідентичні природної мікробіоти. Лактобацили виконують захисну функцію за рахунок створення кислого рН внутрішнього середовища, яка є несприятливою для розвитку і розмноження патогенних мікроорганізмів, і здатні успішно колонізувати урогенітальну зону витісняючи при цьому патогенну мікрофлору.

Молочна кислота, яка входить до складу засобу, розщеплює патологічну біоплівку, що складається з мікробних асоціацій, збільшує вплив антибактеріальних речовин і створює умови для розвитку нормальної мікрофлори піхви.

Супозиторії Кольпофлор відновлюють здоровий вагінальний біоценоз і запобігають розмноженню, і розвиток патогенних мікроорганізмів, відновлюють природне кисле середовище в піхві (рН 3,8-4,5) і підсилюють опір слизової оболонки проти патогенних мікробів.

Показання

Супозиторії Кольпофлор рекомендується застосовувати в якості підтримуючого засобу при станах, що характеризуються порушенням мікрофлори піхви (бактеріальний вагіноз, вагінальний дисбіоз, вагінальний кандидоз, гормонозалежний і неспецифічний кольпіт, специфічний і неспецифічний вагініт, гонорея, хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз і т.д.), і як профілактичний засіб після гінекологічних втручань, використання тампонів, місцевих контрацептивів і при недотриманні гігієнічних норм.

Протипоказання

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарата.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Під час вагітності та в період лактації застосовувати препарат після консультації з лікарем.

Спосіб застосування та дози

До і після застосування супозиторіїв дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки. Супозиторії Кольпофлор застосовувати 1-2 рази на добу (вранці і / або ввечері перед сном). Супозиторій звільнити від стрипа безпосередньо перед застосуванням і ввести глибоко в піхву в положенні лежачи на спині, зігнувши ноги. Супозиторій не слід різати або ламати на частини. Тривалість застосування становить 6-12 днів.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° C.

Упаковка

По 6 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

CYDONIA, Боснія і Герцеговина.