

## **Склад**

### Діючі компоненти:

- Масляний екстракт насіння амаранту - 100 мг.
- Масляний екстракт листя шавлії лікарської - 100 мг.
- Масляний екстракт квіток лаванди вузьколистої - 10 мг.
- Ефірна олія чайного дерева - 15 мг.

## **Лікарська форма**

Супозиторії (свічки) з рослинними екстрактами для вагінального або ректального застосування антисептичної дії.

## **Фармакологічні властивості**

- Екстракт насіння амаранту містить сквален (природна речовина) - донатор кисню, який володіє унікальною здатністю насичувати киснем тканини. Локальна дія насіння амаранту забезпечує прицільний ефект і інтенсивну регенерацію тканин, які зазнали механічного пошкодження (агресивні методи лікування) або роздратування.
- Екстракт шавлії - потужний природний антисептик, діє як на бактеріальну, так і грибкову флору. Усуває спазм, зменшуючи дискомфортні відчуття при болісних менструаціях.
- Екстракт квіток лаванди вузьколистої зміцнює місцевий імунітет і відновлює природний захист організму від патогенної мікрофлори. Також лаванда підсилює дію шавлії як антисептик, забезпечуючи бактеріостатичний ефект на шкідливі мікроорганізми, і до активних речовин лаванди не розвивається резистентність.
- Ефірна олія чайного дерева сприяє інтенсивному зниженню роздратування слизових оболонок і має сильну антисептичну ефектом проти патогенних грибів. Незамінний компонент допоміжної терапії при лікуванні кандидозу і бактеріального вагінозу.

## **Показання**

Супозиторії (свічки) з рослинними екстрактами «Амарелін» можуть бути рекомендовані з метою надання місцевої антисептичної дії, ефективного загоєння мікротравм слизової оболонки статевих органів, зниження інтенсивності запального процесу та профілактики розвитку вірусних і грибкових інфекцій.

## **Протипоказання**

- індивідуальна непереносимість компонентів;
- дитячий вік;
- період вагітності і лактації.

## **Особливості застосування**

Перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовується вагінально або ректально в положенні лежачи, по одному супозиторію 2-3 рази на день (або індивідуальний курс за призначенням лікаря). Перед застосуванням супозиторій необхідно змочити кип'яченою водою, після введення рекомендується полежати 20-30 хвилин.

Курс застосування - від 10-ти днів до 1-го місяця (в залежності від тяжкості стану та індивідуальних особливостей).

## **Діти**

Не застосовувати дітям.

## **Термін придатності**

2 роки від дати виробництва.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.

**Упаковка**

По 10 супозиторіїв у картонній упаковці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

БОВІОС ФАРМ ООО, Україна.