

Склад

1 супозиторій вагінальний містить:

діючі речовини: декспантенол 100 мг, хлоргексидину біглюконат 16 мг;

допоміжні речовини: макрогол 1500, макрогол 400 в необхідній кількості до маси супозиторія 3000 мг.

Лікарська форма

Супозиторії вагінальні. Протимікробний та антисептичний засіб для місцевого застосування.

Фармакологічні властивості

Біфлай комбінований засіб для місцевого застосування, надає регенеруючу, антисептичну, метаболічну дію.

Хлоргексидин, який входить до складу засобу, активний до грампозитивних і грамнегативних бактерій.

Декспантенол стимулює регенерацію слизових оболонок, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і збільшує міцність колагенових волокон. Надає регенеруючу, вітамінізіруюче і протизапальну дію. Не зачіпає функціональну активність лактобацил. Зберігає активність при наявності крові, гною.

Показання

Засіб застосовують для поліпшення регенерації слизових оболонок жіночої статеві сфери після деструктивних методів лікування (діатермокоагуляція, кріодеструкція, лазеродеструкція), в післяопераційному, післяпологовому періодах.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів засобу.

Особливості застосування

- Засіб не сумісний з детергентами, які містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксіметіленцелюлоза) і милом, якщо вони вводяться вагінально.
- Дозволено до застосування у всіх триместрах вагітності та в період годування груддю.
- Особам, що страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Застосовують вагінально.

По 1 свічці 2 рази на добу протягом 7-10 днів. При необхідності можливе продовження курсу застосування до 20 днів. Застосування засобу можливо під час менструації, але доцільно починати після її закінчення або ближче до її завершення (після зменшення кількості виділень).

Термін придатності

2 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.

Упаковка

10 супозиторій по 3 г у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ "Монфарм", Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності