

Склад

діюча речовина: настойка календули (1:10) - 100 мл;

допоміжні речовини: емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м'який, емульгатор "Т-2", олія мінеральна.

Лікарська форма

Мазь. Густа однорідна маса світло-жовтого кольору з сіруватим або зеленуватим відтінком.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що сприяють загоюванню ран.

Код АТС D03AX.

Фармакодинаміка

Препарат чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флованоїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота), які призводять до посилення росту грануляцій, поліпшення епітелізації, підвищення місцевих захисних механізмів.

Показання

Опіки, порізи, тріщини та інші ураження шкіри.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не слід застосовувати особам, схильним до алергічних реакцій на препарати календули. Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не рекомендується застосовувати Календули мазь у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо. Мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від характеру і вираженості паталогічного процесу, досягнутого ефекту.

Діти

Безпека та ефективність застосування мазі дітям віком до 12 років не встановлені, тому призначати препарат цій категорії пацієнтів можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь(за призначенням лікаря).

Передозування

Не виявлено. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції

При індивідуальній підвищеній чутливості можуть спостерігатись алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 г в тубі.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).