

Склад

діючі речовини: 1 мл препарату містить: гліцерину у перерахуванні на 85 % 0,25 г; аміаку розчину 10 % 0,25 мл; етанолу 96 % 0,25 мл;

допоміжна речовина: вода очищена.

Лікарська форма

Рідина нашкірна.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із запахом аміаку.

Фармакотерапевтична група

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТХ D02A X.

Фармакодинаміка

Лікарський засіб має протизапальну та антисептичну дію, покращує еластичність шкіри.

Фармакокінетика

Не вивчалася.

Показання

Застосовують при сухості шкіри рук та тріщинах.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату; виразкові, гнійничкові, травматичні ушкодження шкіри рук.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Взаємодія невідома.

Особливості застосування

Не порушувати правила застосування лікарського засобу. Запобігати потраплянню в очі та на слизові оболонки. Не застосовувати при тріщинах сосків молочної залози.

При випадковому потраплянні Дермасану на слизові оболонки ока - промивати водою декілька разів (протягом 15 хвилин з перервою 10 хвилин) або 3 % розчином борної кислоти. Якщо лікарський засіб потрапив у ніс і глотку, застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі випадкового прийому внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не рекомендується застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо для дорослих. Препарат втирати у чисто вимиту з милом та добре висушену рушником шкіру рук 2 – 3 рази на день.

Термін застосування зумовлений досягнутим ефектом.

Діти

Досвід застосування препарату для лікування дітей відсутній.

Передозування

Не виявлено.

Побічні реакції

Подразнення, дерматити, екзема у місці аплікацій, алергічні реакції.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).