

Склад

діюча речовина: лепехи кореневища (*Calami rhizomata*);

1 фільтр-пакет містить: лепехи кореневищ (*Calami rhizomata*) 1,5 г.

Лікарська форма

Кореневища.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки кореневищ різної форми. Колір жовтуватий або рожевий, іноді зеленуватий з жовтувато-бурими, червонувато-бурими або бурими включеннями.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що підвищують апетит. Код АТХ А15.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату, впливаючи на закінчення смакових рецепторів, підвищують апетит, покращують травлення, посилюють рефлексорне виділення шлункового соку, посилюють жовчовидільну функцію печінки, підвищують тонус жовчного міхура, збільшують діурез; виявляють тонізуючу, протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну, спазмолітичну, антибактеріальну і дезінфікуючу дію.

Показання

Неспецифічні розлади функції травного тракту (відсутність апетиту, розлади травлення і секреторної функції шлунка, ахілія, кишкові коліки, метеоризм) – у складі комплексної терапії. Запальні захворювання порожнини рота і горла.

Протипоказання

Неспецифічні розлади функції травного тракту (відсутність апетиту, розлади травлення і секреторної функції шлунка, ахілія, кишкові коліки, метеоризм) – у складі комплексної терапії. Запальні захворювання порожнини рота і горла.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Знижує ефективність антацидів, блокаторів H_2 -рецепторів (ранітидину, фамотидину).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не встановлена. З обережністю.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказане.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку кореневищ помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

Приготовлений відвар у розведеному вигляді (водою у 2-3 рази) застосовувати для полоскання порожнини рота і горла.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{2}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки.

Приготовлений настій застосовувати для полоскання порожнини рота і горла.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 7 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т. ч. кропив'янка, висипання, свербіж, набряки).

Термін придатності

2 роки – у фільтр-пакети. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.