

## **Склад**

*активні компоненти:* панкреатин (ліпаза 6750 од. ЕФ, амілаза 6300 од. ЕФ, протеаза 450 од. ЕФ) - 150 мг; броиелаїн(1200 GDU/г) - 100,0 мг; папаїн - 100,0 мг; пепсин (2000 од.ЕФ/г) - 10,0 мг; трипсин/хімотрипсин суміш - (13000/ 2250 од. АФ) - 5,0 мг;

*допоміжні компоненти:* мікрокристалічна целюлоза, пектин, гідроксипропілметилцелюлоза, магнію стеарат, діоксид кремнію, титану діоксид, очищена вода.

## **Показання**

Може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування як джерело біологічно активних речовин, ферментів з метою загального зміцнення організму і створення оптимальних дієтологічних умов обміну речовин і нормалізації функцій шлунково-кишкового тракту, зокрема у разі діареї різного походження, дисбактеріозів.

Компенсує недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози за рахунок панкреатину. Чинить протеолітичну, амілолітичну і ліполітичну дію. Ферменти, що входять до складу панкреатину – амілаза, ліпаза і протеаза, – полегшують травлення вуглеводів, жирів і білків, що сприяє їх більш повному всмоктуванню в тонкому кишечнику.

Має імуномодулюючу, протизапальну, фібринолітичну, протинабрякову, антиагрегантну та вторинну знеболювальну дію.

Може бути рекомендована за недостатності функції підшлункової залози, клінічних проявів порушення травлення їжі, метеоризму, схильності до закріпів, в складі комбінованого застосування за великих втрат жовчних кислот, для усунення наслідків інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серця.

## **Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість продукту.

## **Особливості застосування**

З обережністю та під контролем лікаря слід призначати Сувастін під час вагітності та в період лактації.

У більшості випадків побічні ефекти не відзначалися навіть у разі тривалого використання з високими дозами.

В окремих випадках спостерігалися незначні зміни консистенції і запаху калу, шкірні висипання у вигляді кропивниці.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослі – по 1-2 капсули внутрішньо до або після їди, не розжовуючи і запиваючи водою.

За потреби додатково під час їди приймають ще 1-4 капсули. Добова доза може становити 6-18 капсул. Доза визначається індивідуально залежно від ступеня порушення травлення.

Тривалість застосування може варіюватися від кількох днів (за порушень харчування внаслідок огріхів у дієті) до кількох місяців або років.

У дітей продукт застосовується за призначенням лікаря.

*Не перевищувати рекомендовану добову дозу.*

*Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.*

### **Термін придатності**

2 роки від дати виробництва.

### **Умови зберігання**

Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 15 капсул в блістері, по 2 блістери разом з листком- вкладишем у пачці з картону.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Primea Limited, Великобританія.