

Склад

5 мл суспензії містять: молочного кальцію 1000 мг, що еквівалентно: елементарному кальцію 250 мг; фосфору 125 мг; холекальциферолу (вітаміну Д3) 200 МО (IU) (5 мкг (mcg)). Допоміжні речовини: підсолоджувач розчин сорбітолу 70 95 (Е 420), гліцерин (Е 422), пропіленгліколь (Е 1520), ароматизатор ванілі, ксантанова камедь (Е 415), кремнію діоксид колоїдний безводний (Е 551), алюмосилікат магнію (Е 553а), кислота лимонна моногідрат (Е 330), натрію бензоат (Е 211), ментол, кислота аскорбінова (Е 300), токоферолу ацетат (вітамін В).

Поживна (харчова) цінність на 100 г (g): білки 9,2 г (g), жири 0 г (g), вуглеводи 85,2 г (g). *Енергетична цінність (калорійність) на 100 г (g):* 350,6 ккал (kcal) (146,91 кДж (kJ)).

Показання

Вживати дітям з 1-го року як додаткове джерело до раціону харчування при дефіциті в організмі кальцію та вітаміну Д, зумовленого неповноцінною дієтою та/або порушенням харчування; при підвищеній потребі організму в кальції та вітаміні Д, в період вагітності або годування груддю.

Кальцикер Форте здатен регулювати обмін кальцію та фосфору, поповнювати в організмі нестачу кальцію та вітаміну Д, який потрібен для мінералізації зубів, та бере участь у формуванні кісткової тканини, згортанні крові, регулюванні процесів нервової провідності та м'язових скорочень, а також для підтримання стабільної нервової діяльності. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту; діти до 1-го року; захворювання та/або стани, що призводять до гіперкальціємії та/або гіперкальціурії; гіпервітаміноз Д; гіперфосфатемія.

Застереження

Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Приймають внутрішньо безпосередньо перед прийомом їжі або під час їжі. Перед застосуванням флакон добре струсити.

Приймати дітям з 1-го року по 5 мл на добу, розділених на 2-3 прийоми; дорослим по 5 мл 2 рази на добу.

Вагітним і жінкам, які годують груддю, по 10 мл 2 рази на добу.

Тривалість застосування визначається лікарем індивідуально. Курс застосування становить 2 місяці.

Рекомендована добова доза кальцію, фосфору та вітаміну Д:

Вікова група	Мінеральні речовини, вітаміни		
	Кальцій (мг)	Фосфор (мг)	Вітамін Д (мг)
1-3 роки	800	800	10
4-6 років	800	800	10
6 років (учні)	800	800	10
7-10 років	1000	1000	5
11-13 років (хлопчики)	1200	1200	5
11-13 років (дівчатка)	1200	1200	5
14-17 років (юнаки)	1200	1200	5
14-17 років (дівчата)	1200	1200	5
18-59 років (чоловіки)	1200	1200	5
18-59 років (жінки)	1200	1200	5
60 і старше (чоловіки)	1300	1200	10
60 і старше (жінки)	1300	1200	10
Жінки вагітні	1400	1500	5
Жінки годуючі	1500	1600	5

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 200 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Виробник

Корал Лабораторіз Лтд, Індія.