

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 г крему містить цинку оксид 15,25 % (м/м), бензиловий спирт 0,39 % (м/м), бензилбензоат 1,01 % (м/м), бензил цинамат 0,15 % (м/м);

*допоміжні речовини:* ланолін, вода очищена, натрію бензоат (Е 211), віск парафіновий, віск бджолиний синтетичний, віск мікрокристалічний, сорбітансесквіолеат, пропіленгліколь, линалілацетат, ароматизатор лаванди, олія мінеральна, антиоксидант, що містить: пропіленгліколь, кислоту лимонну безводну, бутилгідроксіанізол (Е 320).

## **Лікарська форма**

Крем для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білий, гомогенний крем, без видимих домішок, із запахом лаванди.

## **Фармакотерапевтична група**

Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшуючою та захисною дією. Препарати цинку. Код АТХ D02A B.

## **Фармакодинаміка**

Цинку оксид чинить антисептичну, в'яжучу, протизапальну дію. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та заживлює незначні опіки, неглибокі рани.

Бензиловий спирт має місцеву анестезуючу дію з дезінфікуючими властивостями.

Бензил бензоат має антисептичну дію, також діє як розчинна речовина.

Бензил цинамат є синтезованою речовиною з бензилового спирту та коричної кислоти, яка має антибактеріальну та протигрибкову дію.

## **Показання**

Для місцевого лікування:

- пелюшкового дерматиту;
- попрілостей;
- незначних термічних опіків;

- відмороження I ступеня;
- акне;
- пролежнів;
- екземи.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

## **Особливості застосування**

Тільки для зовнішнього застосування. Не допускати контакту з очима та слизовими оболонками. При потраплянні в очі та на слизові оболонки їх необхідно промити водою.

Не можна курити або перебувати біля відкритого полум'я через небезпеку сильних опіків. Тканина (одяг, постільна білизна, пов'язка тощо), яка контактувала з цим лікарським засобом, легше горить і становить серйозну небезпеку через ризик займання. Прання одягу і постільної білизни може зменшити накопичення препарату, але не може видалити його повністю.

Натрію бензоат може спричинити місцеве подразнення та посилити жовтяницю (пожовтіння шкіри та очей) у новонароджених (віком до 4 тижнів).

Якщо стан після застосування крему не поліпшується або навіть погіршується, слід порадитися з лікарем.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не встановлена.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказання відсутні. Можна застосовувати у період вагітності або годування груддю після консультації з лікарем.

## **Спосіб застосування та дози**

Тільки для зовнішнього застосування.

Якщо не призначено інше, застосовувати дорослим та дітям не частіше 6 разів на добу. Крем слід наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри.

Тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання і визначається індивідуально лікарем.

Якщо стан після застосування лікарського засобу не поліпшується, або навіть погіршується, слід звернутися до лікаря.

## **Діти**

Лікарський засіб можна застосовувати у педіатричній практиці.

## **Передозування**

При місцевому застосуванні передозування малоімовірне. При випадковому прийомі всередину у великих дозах можуть виникати блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.

Лікування симптоматичне.

## **Побічні реакції**

Рідко можуть виникати реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, гіперемію, висипи, зміни у місці нанесення крему; допоміжні речовини, що входять до складу лікарського засобу, можуть спричинити подразнення шкіри та місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 125 г у поліпропіленовій баночці з контролем першого відкриття.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Тосара Фарма Лімітед.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Юніт 146 Белдойл Інд. Істейт, Белдойл, Дублін 13, Ірландія.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).