

## **Склад**

діюча речовина: цефтазидим;

1 флакон містить цефтазидим пентагідрат у кількості, що відповідає цефтазидиму 1000 мг;

допоміжна речовина: натрію карбонат безводний.

## **Лікарська форма**

Порошок для розчину для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок від білого до кремового кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Протимікробні засоби для системного застосування. Інші  $\beta$ -лактамі антибіотики. Цефалоспорины III покоління. Цефтазидим. Код АТХ J01D D02.

## **Фармакодинаміка**

Цефтазидим – це бактерицидний цефалоспориновий антибіотик, механізм дії якого пов'язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини.

Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та може змінюватися з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. Бажано використовувати місцеві (локальні) дані щодо чутливості до антибіотика, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

### Чутливі мікроорганізми

Грампозитивні аероби: *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*.

Грамнегативні аероби: *Citrobacter koseri*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Neisseria meningitidis*, *Proteus mirabilis*, *Proteus spp.*, *Providencia spp.*

### Штами з можливою набутою резистентністю

Грамнегативні аероби: *Acinetobacter baumannii*, *Burkholderia cepacia*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia spp.*, *Morganella morganii*.

Грампозитивні аероби: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus pneumoniae*.

Грампозитивні анаероби: *Clostridium perfringens*, *Peptococcus spp.*,  
*Peptostreptococcus spp.*,

Грамнегативні анаероби: *Fusobacterium spp.*

#### Нечутливі мікроорганізми

Грампозитивні аероби: *Enterococcus spp.*, включаючи *E. faecalis* та *E. faecium*,  
*Listeria spp.*.

Грампозитивні анаероби: *Clostridium difficile*.

Грамнегативні анаероби: *Bacteroides spp.*, включаючи *B. fragilis*.

Інші: *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Legionella spp.*

### **Фармакокінетика**

У пацієнтів після внутрішньом'язової ін'єкції 500 мг та 1 г швидко досягаються середні пікові концентрації 18 і 37 мг/л відповідно. Через 5 хвилин після внутрішньовенного болюсного введення 500 мг, 1 г або 2 г у сироватці крові досягаються концентрації у середньому 46, 87 або 170 мг/л відповідно.

Терапевтично ефективні концентрації залишаються у сироватці крові навіть через 8 – 12 годин після внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення. Зв'язування з білками плазми крові становить приблизно 10 %. Концентрація цефтазидиму, що перевищує МІК для більшості розповсюджених патогенних мікроорганізмів, досягається у таких тканинах і середовищах як кістки, серце, жовч, мокротиння, внутрішньоочна, синовіальна, плевральна та перитонеальна рідини. Цефтазидим швидко проникає крізь плаценту та у грудне молоко.

Препарат погано проникає крізь неушкоджений гематоенцефалічний бар'єр, при відсутності запалення концентрація препарату у ЦНС невелика. Однак при запаленні мозкових оболонок концентрація цефтазидиму у ЦНС становить 4 – 20 мг/л і вище, що відповідає рівню його терапевтичної концентрації.

Цефтазидим не метаболізується в організмі. Після парентерального введення досягається висока та стійка концентрація цефтазидиму у сироватці крові. Період напіввиведення становить приблизно 2 години. Препарат виводиться у незмінному стані, в активній формі із сечею шляхом гломерулярної фільтрації; приблизно 80 – 90 % дози виводиться із сечею протягом 24 годин. У пацієнтів із порушенням функції нирок елімінація цефтазидиму знижується, тому дозу слід зменшувати. Менше 1 % препарату виводиться з жовчю, що значно обмежує кількість препарату, яка потрапляє у кишечник.

## **Показання**

Лікування наведених нижче інфекцій у дорослих та дітей, включаючи новонароджених:

- внутрішньолікарняна пневмонія;
- інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз;
- бактеріальний менінгіт;
- хронічний середній отит;
- зловиякий зовнішній отит;
- ускладнені інфекції сечовивідних шляхів;
- ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин;
- ускладнені інфекції черевної порожнини;
- інфекції кісток і суглобів;
- перитоніт, пов'язаний з проведенням діалізу у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі.

Лікування бактеріємії, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій.

Цефтазидим можна застосовувати для лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції.

Цефтазидим можна застосовувати для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція).

При призначенні цефтазидиму слід враховувати його антибактеріальний спектр, скерований головним чином проти грамнегативних аеробів (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»).

Цефтазидим слід застосовувати з іншими антибактеріальними засобами, якщо очікується, що ряд мікроорганізмів, що спричинили інфекцію, не підпадають під спектр дії цефтазидиму.

Призначати препарат слід згідно з існуючими офіційними рекомендаціями щодо призначення антибактеріальних засобів.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів препарату.

Підвищена чутливість до цефалоспоринових антибіотиків.

Наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (наприклад, анафілактичні реакції) до інших  $\beta$ -лактамних антибіотиків (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Одночасне застосування високих доз препарату з нефротоксичними лікарськими засобами може негативно впливати на функцію нирок (див. розділ «Особливості застосування»).

Хлорамфенікол *in vitro* є антагоністом цефтазидиму та інших цефалоспоринів. Клінічне значення цього явища невідоме, проте, якщо пропонується одночасне застосування Лоразидиму з хлорамфеніколом, слід враховувати можливість антагонізму.

Як і інші антибіотики, Лоразидим може впливати на флору кишечника, що призводить до зменшення реабсорбції естрогенів та зниження ефективності комбінованих пероральних контрацептивних засобів.

Цефтазидим не впливає на результати визначення глюкозурії ензимними методами, проте невеликий вплив на результати аналізу може спостерігатися при застосуванні методів відновлення міді (Бенедикта, Фелінга, Клінітест).

Цефтазидим не впливає на лужнопікатний метод визначення креатиніну.

### **Особливості застосування**

Як і при застосуванні інших  $\beta$ -лактамних антибіотиків, повідомляли про тяжкі та часом летальні реакції гіперчутливості. У разі виникнення тяжких реакцій гіперчутливості лікування цефтазидимом слід негайно припинити та розпочати відповідні невідкладні заходи.

Перед початком лікування слід визначити у пацієнта наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості до цефтазидиму, цефалоспоринових антибіотиків або інших  $\beta$ -лактамних антибіотиків. З обережністю препарат призначати пацієнтам, у яких були несерйозні реакції гіперчутливості на інші  $\beta$ -лактамні антибіотики.

Цефтазидим має обмежений спектр антибактеріальної активності. Він не є прийнятним препаратом для монотерапії деяких типів інфекцій, якщо тільки невідомий збудник хвороби і невідомо, що він є чутливим до цього препарату або існує велика вірогідність того, що можливий збудник буде чутливим до лікування цефтазидимом. Це особливо важливо, коли вирішується питання про лікування пацієнтів з бактеріємією, бактеріальним менінгітом, інфекціями шкіри та м'яких

тканин та інфекціями кісток та суглобів. Крім того, цефтазидим чутливий до гідролізу деякими  $\beta$ -лактамазами з розширеним спектром дії. Тому при виборі цефтазидиму для лікування слід враховувати інформацію про розповсюдження мікроорганізмів, що продукують  $\beta$ -лактамази з розширеним спектром дії.

Одночасне лікування високими дозами цефалоспоринів і нефротоксичними препаратами, такими як аміноглікозиди або сильнодіючі діуретики (наприклад, фуросемід), може несприятливо впливати на функцію нирок. Досвід клінічного застосування цефтазидиму показав, що при дотриманні рекомендованого дозування це явище малоймовірне. Немає даних, що цефтазидим несприятливо впливає на функцію нирок у звичайних терапевтичних дозах.

Цефтазидим виводиться нирками, тому дозу слід зменшувати відповідно до ступеня ураження нирок. Повідомляли про випадки неврологічних ускладнень, коли доза не була відповідно зменшена (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Як і при застосуванні інших антибіотиків широкого спектра дії, тривале лікування Лоразидимом може призвести до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів (наприклад, *Candida*, *Enterococci*); у цьому випадку може бути необхідним припинення лікування або вживання інших необхідних заходів. Дуже важливо постійно контролювати стан хворого.

При застосуванні антибіотиків повідомляли про випадки псевдомембранозного коліту, що може бути різного ступеня тяжкості від легкого до такого, що загрожує життю. Тому важливо зважити на встановлення цього діагнозу у пацієнтів, у яких виникла діарея під час або після застосування антибіотика. У разі тривалої та значної діареї або якщо у пацієнта виникають абдомінальні спазми, лікування слід негайно припинити, провести подальше обстеження пацієнта та при необхідності призначити специфічне лікування *Clostridium difficile*. Не слід призначати лікарські засоби, що уповільнюють перистальтику кишечника.

Як і при застосуванні інших цефалоспоринів і пеніцилінів широкого спектра дії, деякі раніше чутливі штами *Enterobacter spp.* і *Serratia spp.* можуть стати резистентними під час лікування цефтазидимом. У таких випадках слід періодично виконувати дослідження на чутливість.

Лоразидим у своєму складі містить натрій (1 флакон з 500 мг цефтазидиму містить 24 мг натрію, флакон з 1 г цефтазидиму – 48 мг натрію), що слід враховувати при лікуванні пацієнтів, які знаходяться на натрій-контрольованій дієті.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Відповідних досліджень не проводили. Але виникнення таких побічних реакцій як запаморочення може вплинути на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами (див. розділ «Побічні реакції»).

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Дані щодо лікування цефтазидимом вагітних обмежені. Дослідження на тваринах не вказують на прямий або непрямий шкідливий вплив на вагітність, ембріональний або постнатальний розвиток. Призначати препарат вагітним слід тільки тоді, коли користь від його застосування переважає можливий ризик.

Цефтазидим екскретується у грудне молоко у невеликих кількостях, але при застосуванні терапевтичних доз впливу на немовля, яке знаходиться на грудному годуванні, не очікується. Цефтазидим можна застосовувати у період годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослі та діти  $\geq 40$  кг

| <i>Інтермітуюче введення</i>                                              |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Інфекція</b>                                                           | <b>Доза, що вводиться</b>                                                     |
| інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз                        | 100 – 150 мг/кг маси тіла/на добу кожні 8 годин, максимально до 9 г на добу 1 |
| фебрильна нейтропенія                                                     | 2 г кожні 8 годин                                                             |
| внутрішньолікарняна пневмонія                                             |                                                                               |
| бактеріальний менінгіт                                                    |                                                                               |
| бактеріємія*                                                              |                                                                               |
| інфекції кісток і суглобів                                                | 1 – 2 г кожні 8 годин                                                         |
| ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин                                |                                                                               |
| ускладнені інтраабдомінальні інфекції                                     |                                                                               |
| перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом |                                                                               |
| ускладнені інфекції сечовивідних шляхів                                   | 1 – 2 г кожні 8 годин або 12 годин                                            |

|                                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція) | 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера                                 |
| хронічний середній отит                                                                               | 1 – 2 г кожні 8 годин                                                                             |
| злюякісний зовнішній отит                                                                             |                                                                                                   |
| Постійна інфузія                                                                                      |                                                                                                   |
| Інфекція                                                                                              | Доза, що вводиться                                                                                |
| фебрильна нейтропенія                                                                                 | навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням від 4 до 6 г кожні 24 години1 |
| внутрішньолікарняна пневмонія                                                                         |                                                                                                   |
| інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз                                                    |                                                                                                   |
| бактеріальний менінгіт                                                                                |                                                                                                   |
| бактеріємія*                                                                                          |                                                                                                   |
| інфекції кісток і суглобів                                                                            |                                                                                                   |
| ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин                                                            |                                                                                                   |
| ускладнені інтраабдомінальні інфекції                                                                 |                                                                                                   |
| перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом                             |                                                                                                   |
| 1 У дорослих пацієнтів із нормальною функцією нирок 9 г на добу застосовували без побічних реакцій.   |                                                                                                   |

Діти < 40 кг

|                                                                        |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Немовлята та діти віком &gt; 2 місяців та масою тіла &lt; 40 кг</b> | <b>Інфекція</b> | <b>Звичайна доза</b> |
| <i>Інтермітуюче введення</i>                                           |                 |                      |

|  |                                                                           |                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | ускладнені інфекції сечовивідних шляхів                                   | 100 – 150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу |
|  | хронічний середній отит                                                   |                                                                        |
|  | злюкисний зовнішній отит                                                  |                                                                        |
|  | нейтропенія у дітей                                                       | 150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу       |
|  | інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз                        |                                                                        |
|  | бактеріальний менінгіт                                                    |                                                                        |
|  | бактеріємія*                                                              |                                                                        |
|  | інфекції кісток і суглобів                                                | 100 – 150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу |
|  | ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин                                |                                                                        |
|  | ускладнені інтраабдомінальні інфекції                                     |                                                                        |
|  | перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом |                                                                        |

#### *Постійна інфузія*

|  |                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | фебрильна нейтропенія                                                     | Вводиться навантажувальна доза 60 – 100 мг/кг маси тіла з наступним постійним інфузійним введенням 100 – 200 мг/кг маси тіла на добу, максимально до 6 г на добу |
|  | внутрішньолікарняна пневмонія                                             |                                                                                                                                                                  |
|  | інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз                        |                                                                                                                                                                  |
|  | бактеріальний менінгіт                                                    |                                                                                                                                                                  |
|  | бактеріємія*                                                              |                                                                                                                                                                  |
|  | інфекції кісток і суглобів                                                |                                                                                                                                                                  |
|  | ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин                                |                                                                                                                                                                  |
|  | перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом |                                                                                                                                                                  |

|                                            |                 |                      |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Немовлята та діти віком ≤ 2 місяців</b> | <b>Інфекція</b> | <b>Звичайна доза</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|

#### *Інтермітуюче введення*

|  |                    |                                                       |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Більшість інфекцій | 25 – 60 мг/кг маси тіла/добу у 2 прийоми <sup>1</sup> |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------|

1 У немовлят та дітей віком  $\leq 2$  місяців період напіввиведення із сироватки крові може бути у 2 – 3 рази більший, ніж у дорослих

\*якщо це асоціюється або є підозра на асоціювання з інфекціями, наведеними у розділі «Показання».

## Діти

Безпека та ефективність застосування Лоразидиму шляхом постійної внутрішньовенної інфузії у немовлят та дітей  $\leq 2$  місяців не встановлені.

## Пацієнти літнього віку

Враховуючи зниження кліренсу цефтазидиму, для хворих літнього віку, які мають гострі інфекції, добова доза зазвичай не повинна перевищувати 3 г, особливо у пацієнтів віком від 80 років.

## Печінкова недостатність

Необхідності у зміні дозування для хворих із легкою та помірною печінковою недостатністю немає. Клінічних досліджень у хворих із тяжкою печінковою недостатністю не проводили. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

## Ниркова недостатність

Цефтазидим виводиться нирками у незміненому стані. Тому пацієнтам із порушеннями функції нирок дозу слід зменшити.

Початкова доза повинна становити 1 г. Визначення підтримуючої дози повинно базуватися на швидкості гломерулярної фільтрації.

*Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності – інтермітуюче введення*

## Дорослі та діти $\geq 40$ кг маси тіла

| Кліренс креатиніну, мл/хв | Приблизний рівень креатиніну у сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл) | Рекомендована одноразова доза цефтазидиму, г | Частота дозування (години) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|

|       |                          |     |    |
|-------|--------------------------|-----|----|
| 50-31 | 150 – 200<br>(1,7 – 2,3) | 1   | 12 |
| 30-16 | 200 – 350<br>(2,3 – 4)   | 1   | 24 |
| 15-6  | 350 – 500<br>(4 – 5,6)   | 0,5 | 24 |
| < 5   | > 500<br>(> 5,6)         | 0,5 | 48 |

Пацієнтам із тяжкими інфекціями одноразову дозу можна збільшити на 50 % або відповідно збільшити частоту введення. Таким пацієнтам рекомендується контролювати рівень цефтазидиму у сироватці крові.

У дітей кліренс креатиніну слід відкоригувати відповідно до площі поверхні тіла або до маси тіла.

Діти < 40 кг

| <b>Кліренс<br/>креатиніну,<br/>мл/хв**</b> | <b>Приблизний<br/>рівень<br/>креатиніну* у<br/>сироватці крові,<br/>мкмоль/л (мг/дл)</b> | <b>Рекомендована<br/>індивідуальна<br/>доза мг/кг маси<br/>тіла</b> | <b>Частота<br/>дозування<br/>(години)</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 50-31                                      | 150 – 200<br>(1,7 – 2,3)                                                                 | 25                                                                  | 12                                        |
| 30-16                                      | 200 – 350<br>(2,3 – 4)                                                                   | 25                                                                  | 24                                        |

|      |                        |      |    |
|------|------------------------|------|----|
| 15-6 | 350 – 500<br>(4 – 5,6) | 12,5 | 24 |
| < 5  | > 500<br>(> 5,6)       | 12,5 | 48 |

\*це рівень креатиніну у сироватці крові, розрахований відповідно до рекомендацій, і може точно не відповідати рівню зменшення функції нирок у всіх пацієнтів з нирковою недостатністю.

\*\* кліренс креатиніну, вирахований на основі площі поверхні тіла, або визначений.

Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

*Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності – постійна інфузія*

Дорослі та діти  $\geq$  40 кг маси тіла

| <b>Кліренс креатиніну,<br/>мл/хв</b> | <b>Приблизний рівень<br/>креатиніну у сироватці<br/>крові, мкмоль/л (мг/дл)</b> | <b>Частота дозування<br/>(години)</b>                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-31                                | 150 – 200<br>(1,7 – 2,3)                                                        | Вводиться<br>навантажувальна доза 2 г<br>з наступним постійним<br>інфузійним введенням від<br>1 до 3 г кожні 24 години |
| 30-16                                | 200 – 350<br>(2,3 – 4)                                                          | Вводиться<br>навантажувальна доза 2 г<br>з наступним постійним<br>інфузійним введенням 1 г<br>кожні 24 години          |
| $\leq$ 15                            | > 350<br>(4 – 5,6)                                                              | Не досліджувалося                                                                                                      |

Вибір дози слід проводити з обережністю. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

## Діти < 40 кг

Безпека та ефективність застосування Лоразидиму шляхом постійної внутрішньовенної інфузії дітям, маса тіла яких < 40 кг, із порушеною функцією нирок не встановлені. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

Якщо дітям із порушеною функцією нирок необхідно застосувати препарат шляхом постійної внутрішньовенної інфузії, слід кліренс креатиніну скорегувати відповідно до площі поверхні тіла дитини або маси тіла.

## Гемодіаліз

Період напіввиведення цефтазидиму із сироватки крові під час гемодіалізу становить від 3 до 5 годин.

Після кожного сеансу гемодіалізу слід вводити підтримуючу дозу цефтазидиму, що рекомендується у таблиці, наведеній нижче.

## Перитонеальний діаліз

Цефтазидим можна застосовувати при перитонеальному діалізі у звичайному режимі та при тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі.

Крім внутрішньовенного застосування, цефтазидим можна включати до діалізної рідини (зазвичай від 125 до 250 мг на 2 л діалізного розчину).

Для пацієнтів із нирковою недостатністю, яким проводиться тривалий артеріовенозний гемодіаліз або високопоточна гемофільтрація у відділеннях інтенсивної терапії, рекомендована доза становить 1 г на добу у вигляді одноразової дози або за кілька прийомів. Для низькопоточної гемофільтрації слід застосовувати дози, як при порушенні функції нирок.

Пацієнтам, яким проводиться веновенозна гемофільтрація та веновенозний гемодіаліз, рекомендації з дозування наведені у таблицях.

*Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривала веновенозна гемофільтрація*

| <b>Резидуальна функція нирок (кліренс креатиніну, мл/хв)</b> | <b>Підтримуюча доза (мг) залежно від швидкості ультрафільтрації (мл/хв)<sup>a</sup></b> |             |             |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                              | <b>5</b>                                                                                | <b>16,7</b> | <b>33,3</b> | <b>50</b> |

|    |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 5  | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 10 | 250 | 500 | 500 | 750 |
| 15 | 250 | 500 | 500 | 750 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 750 |

аПідтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.

*Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривалий веновенозний гемодіаліз*

| <b>Резидуальна<br/>функція<br/>нирок<br/>(кліренс<br/>креатиніну,<br/>мл/хв)</b> | <b>Підтримуюча доза (мг) для діалізату при швидкості потоку<br/>(мл/хв)а</b> |          |          |                                           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                  | <b>1 л/год</b>                                                               |          |          | <b>2 л/год</b>                            |          |          |
|                                                                                  | <b>Швидкість<br/>ультрафільтрації<br/>(л/год)</b>                            |          |          | <b>Швидкість ультрафільтрації (л/год)</b> |          |          |
|                                                                                  | <b>0,5</b>                                                                   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0,5</b>                                | <b>1</b> | <b>2</b> |
| 0                                                                                | 500                                                                          | 500      | 500      | 500                                       | 500      | 750      |
| 5                                                                                | 500                                                                          | 500      | 750      | 500                                       | 500      | 750      |
| 10                                                                               | 500                                                                          | 500      | 750      | 500                                       | 750      | 1000     |
| 15                                                                               | 500                                                                          | 750      | 750      | 750                                       | 750      | 1000     |
| 20                                                                               | 750                                                                          | 750      | 1000     | 750                                       | 750      | 1000     |

аПідтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.

### Введення.

Лоразидим вводити внутрішньовенно ін'єкційно або інфузійно або шляхом глибокої внутрішньом'язової ін'єкції. Рекомендованими ділянками для внутрішньом'язового введення є верхній зовнішній квадрант великого сідничного м'яза або латеральна частина стегна.

Розчини цефтазидиму можна вводити безпосередньо у вену або у систему для внутрішньовенних інфузій, якщо пацієнт отримує рідини парентерально.

Доза залежить від тяжкості захворювання, чутливості, локалізації та типу інфекції, а також від віку та функції нирок пацієнта.

Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та може змінюватися з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. Бажано використовувати місцеві (локальні) дані щодо чутливості до антибіотика, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

#### Інструкція з приготування

Лоразидим сумісний з більшістю широковживаних розчинів для внутрішньовенного введення. Однак не слід застосовувати як розчинник натрію бікарбонат для ін'єкцій.

| Доза, що вводиться |                         | Необхідна кількість розчинника (мл) | Приблизна концентрація (мг/мл) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 250 мг             | Внутрішньом'язово       | 1                                   | 210                            |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 2,5                                 | 90                             |
| 500 мг             | Внутрішньом'язово       | 1,5                                 | 260                            |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 5                                   | 90                             |
| 1 г                | Внутрішньом'язово       | 3                                   | 260                            |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 10                                  | 90                             |
|                    | Внутрішньовенна інфузія | 50*                                 | 20                             |

**\*Примітка.** Розчинення слід проводити у два етапи (див. текст).

Колір розчину варіює від світло-жовтого до бурштинового залежно від концентрації, розчинника та умов зберігання. При дотриманні рекомендацій дія препарату не залежить від варіацій його забарвлення.

Цефтазидим у концентраціях від 1 мг/мл до 40 мг/мл сумісний з такими розчинами:

0,9 % розчин натрію хлориду; М/6 розчин натрію лактату; розчин Хартмана; 5 % розчин глюкози; 0,225 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози; 0,45 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози; 0,9 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози;

0,18 % розчин натрію хлориду та 4 % розчин глюкози; 10 % розчин глюкози; 10 % розчин глюкози та 0,9 % розчин натрію хлориду; 10 % розчин глюкози та 5 % розчин глюкози;

6 % розчин декстрану та 0,9 % розчин натрію хлориду; 6 % розчин декстрану та 5 % розчин глюкози.

Цефтазидим у концентраціях від 0,05 мг/мл до 0,25 мг/мл сумісний з рідиною для інтраперитонеального діалізу (лактатом).

Цефтазидим для внутрішньом'язового введення можна розчиняти у 0,5 % або 1 % розчині лідокаїну гідрохлориду.

Ефективність обох препаратів зберігається при змішуванні цефтазидиму у дозі 4 мг/мл з такими речовинами: гідрокортизон (гідрокортизону натрію фосфат) 1 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій або 0,5 % розчині глюкози; цефуроксим (цефуроксим натрію)

3 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; флоксацилін (флоксацилін натрію)

4 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; гепарин 10 МО/мл або 50 МО/мл у

0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; калію хлорид 10 мекв/л або

40 мекв/л у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій.

Вміст флакона Лоразидиму 500 мг, розчинений у 1,5 мл води для ін'єкцій, можна додати до розчину метронідазолу (500 мг у 100 мл), при цьому обидва препарати зберігають свою активність.

Приготування розчинів для внутрішньом'язової або внутрішньовенної болюсної ін'єкції

1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести рекомендований об'єм розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Перевернути флакон. При повністю введеному поршні шприца вставити голку у флакон. Набрати весь розчин у шприц, при цьому голка весь час повинна бути у розчині.

*Приготування розчинів для внутрішньовенної інфузії (флакон 1 г)*

1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести 10 мл розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Не вставляти голку для повітря до повного розчинення препарату. Вставити голку для повітря через кришку у флакон для послаблення внутрішнього тиску у флаконі.
4. Не виймаючи голку для повітря, довести загальний об'єм до 50 мл. Вийняти голку для повітря, струсити флакон і налагодити систему для інфузій як зазвичай.

**Примітка.** Щоб забезпечити стерильність препарату, дуже важливо не вставляти голку для повітря через кришку до розчинення препарату.

Готовий розчин можна зберігати протягом 24 годин при температурі нижче 25 °C або протягом 7 днів при температурі до 4 °C.

## **Діти**

Застосовувати дітям з перших днів життя.

## **Передозування**

Передозування може призвести до неврологічних ускладнень, таких як енцефалопатія, судоми і кома. Симптоми передозування можуть виникнути у пацієнтів із нирковою недостатністю, якщо не зменшити у них відповідно дозу (див розділи «Спосіб застосування та дози» та «Особливості застосування»). Концентрацію цефтазидиму у сироватці крові можна зменшити шляхом гемодіалізу або перитонеального діалізу.

## **Побічні реакції**

### *Інфекції та інвазії*

Кандидоз (включаючи вагініт і афтозний стоматит).

### *З боку кровоносної та лімфатичної систем*

Еозинофілія, тромбоцитоз, лейкопенія, нейтропенія і тромбоцитопенія, лімфоцитоз, гемолітична анемія та агранулоцитоз.

### *З боку імунної системи*

Анафілаксія (включаючи бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію).

### *З боку нервової системи*

Запаморочення, головний біль, парестезії.

Повідомляли про випадки неврологічних ускладнень, таких як тремор, міоклонія, судоми, енцефалопатія та кома у хворих із нирковою недостатністю, для яких доза цефтазидиму не була відповідно зменшена.

### *З боку судин*

Флебіт або тромбофлебіт у місці введення препарату.

### *З боку шлунково-кишкового тракту*

Діарея, нудота, блювання, біль у животі та коліт.

Як і при застосуванні інших цефалоспоринів, коліт може бути пов'язаний з *Clostridium difficile* і може проявлятися у вигляді псевдомембранозного коліту (див. розділ «Особливості застосування»).

Порушення смаку.

### *З боку сечовидільної системи*

Інтерстиціальний нефрит, гостра ниркова недостатність.

### *З боку гепатобіліарної системи*

Транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, лужна фосфатаза). Жовтяниця.

### *З боку шкіри та підшкірної тканини*

Макулопапульозний висип або кропив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз.

### *Загальні та розлади у місці введення*

Біль та/або запалення у місці внутрішньом'язової ін'єкції, гарячка.

### *Лабораторні показники*

Позитивний тест Кумбса, як і при застосуванні деяких інших цефалоспоринів, інколи спостерігалось транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові.

Позитивна реакція Кумбса спостерігається приблизно у 5 % пацієнтів, що може впливати на визначення групи крові.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 1 флакону у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

За рецептом.

### **Виробник**

Ексір Фармасьютікал Компані, Іран/Exir Pharmaceutical Company, Iran.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

2-ий км Рінг Роуд, Боруджерд 69189, Іран/2nd Km Ring Road, Boroujerd 69189, Iran.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).