

Склад

діючі речовини: формальдегід, етанол;

50 мл розчину містять розчину формальдегіду в перерахуванні на 35 % вміст формальдегіду - 10,0 г, етанолу 96 % - 39,5 г;

допоміжні речовини: одеколон, вода очищена.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні препарати. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі. Код АТХ D11A A.

Фармакологічні властивості

Препарат чинить дезінфікуючу та дезодоруючу дію.

Показання

Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Захворювання шкіри. Дитячий вік до 14 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не описана.

Особливості застосування

Різка почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного припинення застосування препарату.

З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо. Дорослим і дітям старше 14 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1-2 рази на добу.

Діти

Не застосовується у дітей віком до 14 років.

Передозування

Не слід допускати передозування препарату. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербіжу, подразнення, що є ознаками передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.

Побічні реакції

Подразнення шкіри, алергічні реакції, відчуття свербіжу.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

4 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл у флаконі в пачці або без пачки.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).