

Склад

1 таблетка масою 400 мг (mg) містить:

Цитиколін	250 мг (mg)
Вітамін В ₁₂	2,5 мкг (µg)
Вітамін В ₆	1,4 мг (mg)
Вітамін В ₁	1,1 мг (mg)

Склад: цитиколін (цитидин-5-дифосфохолін), наповнювач (мікрокристалічна целюлоза), загусник (картопляний крохмаль), антизлежувачі (ізомальт, магнію стеарат, тальк), піридоксину гідрохлорид (вітамін В₆), тіаміну гідрохлорид (вітамін В₁), антизлежувач (кремнію діоксид), ціанокобаламін 0, 1 % (Вітамін В₁₂)

Без ГМО.

Показання до використання

БРЕЙНАКСОН ВІТА® може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело поживних речовин – вітамінів В₁, В₆, В₁₂ та цитидин-5-дифосфохоліну.

Складові БРЕЙНАКСОН ВІТА® сприяють підтримці нормального функціонування нервової системи.

Цитиколін легко гідролізується при прийомі внутрішньо, розщеплюючись до холіну та цитидину, що забезпечує організм джерелом холіну. Це попередник нейромедіатора ацетилхоліну, який підтримує когнітивні функції: пам'ять, концентрацію, увагу, навчання та розумову діяльність.

Вітаміни В₁, В₆ та В₁₂ сприяють зниженню втоми та втомлюваності, нормальній роботі нервової системи та нормальній психічній діяльності.

Спосіб застосування та дози

По 1 таблетці 1-2 рази на добу запиваючи водою або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження

БРЕЙНАКСОН ВІТА® не рекомендується приймати разом з ліками, що містять центрофеноксин; при індивідуальній гіперчутливості до основних складових речовин; вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінному раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності

Краще спожити до кінця дати зазначеної на упаковці; термін придатності – 24 місяці від дати виробництва.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Форма випуску

Таблетки масою 400 мг (mg); по 30 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній пачці; по 15 таблеток у блістері, по 2 блістера у картонній пачці.

Виробник

Найменування виробника: Тантус Сп. з о.о., вул. Грюнвальдська 39А, 05-800 Прушков, Польща на замовлення ЕмергоФарм Сп. з о.о. Сп. К. вул. Яна Цішевського 15, 02-777 Варшава, (Кен Центр), Польща.

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «АСІНО УКРАЇНА», бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, м. Київ, 03124, Україна.