

Склад

діюча речовина: іхтіол;

1 г мазі містить іхтіолу 100 мг;

допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь темно-бурого кольору із запахом іхтіолу. За зовнішнім виглядом мазь має бути однорідною.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакодинаміка

Фармакологічні властивості мазі іхтіолової зумовлені дією біологічно активних речовин іхтіолу. Мазь іхтіолова має антимікробну (бактерицидну та бактеріостатичну), протизапальну та місцевознеболювальну дію.

Фармакокінетика

При зовнішньому застосуванні іхтіолова мазь практично не абсорбується у системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Показання

Опіки, екзема, бешихове запалення, невралгія, артрити.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів, солей важких металів.

Особливості застосування

Уникати потрапляння мазі на слизові оболонки.

Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Жінкам, що годують груддю, не допускати потрапляння мазі на соски. Безпека та ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися.

Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу та прикривають пов'язкою. Тривалість курсу лікування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

Для лікування бешихового запалення та ускладнених форм опіків, артритів, невралгії, екземи використовується у складі комплексного лікування.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти

Досвід застосування дітям не описаний.

Передозування

Повідомлень про випадки передозування не надходило.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції, подразнення шкіри (печіння, свербіж, висипання, почервоніння шкіри), особливо на початку лікування та при тривалому застосуванні. При появі сильного подразнення шкіри чи інших незвичних реакцій застосування мазі слід припинити.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 г у тубах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).