

Опис

Натуральний протизапальний засіб з антипроліферативним та імуномодуючим ефектом для попередження розвитку неопластичних змін при хронічних запаленнях, запобігання рецидивів та відновлення після протипухлинної терапії при гінекологічних та урологічних захворюваннях органів малого тазу.

Склад

Активований екстракт прополісу, екстракти чистотілу, катарантуса рожевого (барвінку), звіробою, нагідок, олія обліпихи, кислота аскорбінова. Допоміжні речовини: твердий жир, бджолиний віск, полісорбат, диметилсульфоксид, поліетиленоксид.

Властивості

Протизапальний полікомпонентний натуральний препарат АПІ-НОРМ[®]НЕО поєднує відновлення виснаженого потенціалу захисних механізмів клітини з ефектами пригнічення небажаної підвищеної проліферації і активації функції самознищення дефектних клітин, приводячи ці функції до фізіологічної норми.

Загальною властивістю, що притаманна натуральним полікомпонентним препаратам місцевого застосування, є нормалізація чутливості одразу багатьох регуляторних систем клітини, що були порушені внаслідок тривалого подразнення факторами, що уражують клітини. Це забезпечується одночасним впливом на широкий спектр різних сигнальних і біохімічних каскадів різноманітним біологічним речовинам, що потрапили безпосередньо до клітин у місці застосування, оминаючи повного або часткового руйнування у шлунково-кишковому тракті та печінці. Такий підхід буває особливо ефективним при хронічних запаленнях, коли клітини або тканини, що не мали можливості самостійно впоратися із тривалою пошкоджувальною дією, майже перестають на неї реагувати. Поєднання живлення клітин мікроелементами з помірною антибактеріальною дією не антибіотикової природи призводить до нормалізації мікробіоценозу без знищення нормальної мікрофлори.

Завдяки комплексу властивостей натуральний препарат "АПІ-НОРМ[®]НЕО супозиторії вагінальні" активує місцевий імунітет, знімає запалення, насичує клітини необхідними мікроелементами, пригнічує надмірний поділ клітин, чим **створює умови для ефективного лікування хронічних запалень та неоплазій.**

Багатокомпонентний склад АПІ-НОРМ® НЕО при місцевому застосуванні забезпечує

- пригнічення надлишкової проліферації;
- детоксикацію продуктів розпаду клітин та інших токсинів;
- локальне поповнення виснажених резервів мікроелементів і макромолекул, необхідних для забезпечення систем клітинного захисту;
- відновлення і нормалізацію імунних властивостей клітин і тканин;
- зняття надлишкового навантаження з антиоксидантних та інших захисних механізмів клітини;
- руйнування захисної біоплівки бактерій, що забезпечує їх терапевтичну доступність;
- створення
- антисептичного напівпроникливого воскового покриття поверхні рани і нервових закінчень;
- зняття запалень та набрякlostі при помірному знеболюючому ефекті;
- глибоке проникнення діючих речовин досягає практично всі органи малого тазу;
- нормалізацію мікробіоценозу порожнистих органів малого тазу;
- знижує дію чинників, що стимулюють переродження клітин, чим перешкоджає розвитку передракових станів та запобігає рецидивам неоплазій.

Застосовується

- **для запобігання та профілактики** хронічних запалень, розвитку неопластичних процесів в органах малого тазу, підсилення місцевої імунної відповіді, ініціації апоптозу (загибелі) змінених клітин;
- **у комплексній терапії** як допоміжний засіб перед оперативними втручаннями та після проведення протипухлинної терапії для зниження локальної інтоксикації, запобігання ускладнень, створення умов “безпечному” фізіологічному загоєнню післяопераційних ран з інгібуванням надлишкової проліферації; відновлення імунного захисту та попередження рецидивів.
- **при паліативному догляді** як місцевий протинабряковий, протизапальний і знеболюючий засіб з ефектом пригнічення росту, малігнізації та розповсюдження новоутворень.

Показання до використання

В гінекології при хронічних запальних процесах в органах малого тазу, при порушенні місцевого імунітету, загрозі виникнення та розвитку неопластичних

процесів, в комплексній протипухлинній терапії слизової піхви та шийки матки, дисплазіях шийки матки, ендометритах, гіперплазії ендометрію, сальпінгофоритах та інших захворюваннях органів малого тазу;

в урології при хронічних запальних процесах, що загрожують розвитком неопластичних змін в комплексній протипухлинній терапії сечовидільної системи.

Протипоказання

Не застосовувати при вагітності. В період лікування необхідно припинити грудне годування. З обережністю застосовувати при важких порушеннях функції печінки, прояві індивідуальної гіперчутливості до будь якого з компонентів препарату. Під час лікування доцільно утримуватися від статевих стосунків, інших травмуючих дій, вживання гострої їжі та спиртовмісних напоїв.

Спосіб застосування

Супозиторій вводять в піхву після гігієнічних процедур на глибину вказівного пальця. Після введення супозиторія рекомендується полежати 15 хвилин на лівому чи правому боці. При пошкодженій слизовій оболонці, перші два дні впродовж 3-5 хвилин може відчуватися печіння, що є припустимим. Для запобігання фарбування натільної білизни рекомендується використання гігієнічних прокладок.

При хронічних запальних процесах і неопластичних змінах в органах малого тазу застосовують по 1 супозиторію на ніч протягом 10-15 днів. В залежності від перебігу хвороби, таких курсів може бути до трьох. Перерва між курсами має становити 5 днів.

Особливості застосування

Для підсилення терапевтичної доступності матки, фаллопієвих труб і яєчників застосовують одночасно вагінальні супозиторії АПІ-НОРМ® НЕО – вагінально та ректальні супозиторії АПІ-НОРМ® НЕО – ректально по 1 супозиторію кожного виду на ніч. Курс подвійного застосування становить 10 днів. Перерва між курсами має бути 5 днів. Рішення про подальше застосування приймається за результатами оцінки динаміки змін.

В період реабілітації після променевої та хіміотерапії АПІ-НОРМ® НЕО починають застосовувати на другий день після закінчення курсів променевої та на 7-10-й день після закінчення курсу хіміотерапії по 1 супозиторію на ніч протягом 10-15 днів. Тривалість застосування визначають динамікою реабілітації.

У разі повільної позитивної динаміки курс можна повторити, зробивши перерву в прийомі 5 днів. Таких курсів може бути до трьох.

У передопераційний період АПІ-НОРМ® НЕО використовують для зменшення набряків, для профілактики розвитку сепсису, підвищення резектабельності пухлини. З цією метою застосовують по 1 супозиторію на ніч протягом 5-10 днів. Для уникнення маскування операційного поля додатковим забарвленням застосування супозиторіїв слід припинити за 2-3 дні до операції.

У післяопераційний період на другий день після оперативного втручання на органах малого тазу застосовують по 1-2 супозиторія на добу для зняття набрякості, попередження запалень, виникнення сепсису, знеболювання та пригнічення надлишкової проліферації. Тривалість застосування визначається динамікою відновних процесів. Через 10-15 днів прийому необхідно робити перерву на 5 днів.

Для паліативної допомоги та у випадках неможливості або недоцільності подальшого проведення повноцінної цитотоксичної терапії та хірургічного втручання, супозиторії АПІ-НОРМ® НЕО застосовують для гальмування розвитку пухлинного процесу, зняття запалень, знеболювання, поліпшення загального стану. Можна використовувати як епізодично, так і курсами, тривалістю 10-15 днів по 2 супозиторія на добу. Між курсами потрібно робити перерви по 5 днів.

Для попередження розвитку рецидивів хронічних запалень і неопластичних змін в органах малого тазу, у пацієнтів, що мали онкологічний інцидент або генетичну схильність – кожні три місяці протягом двох років та особливо в осінній і весняний періоди рекомендується проводити профілактичні курси по 1 супозиторію на ніч, щодня або через день, на протязі 10-15 днів. При погіршенні стану можливо проводити додаткові підтримуючі курси по 1 супозиторію протягом 10 днів.

Побічні ефекти

Можливі загальна слабкість, запаморочення, нудота, біль в суглобах, розлади шлунково-кишкового тракту, печіння та свербіж у піхві. При появі подібних симптомів прийом препарату зменшують до 1 супозиторія на добу терміном до 3-5 днів. Після чого слід продовжити намічений курс. Якщо вищезазначені чи інші побічні ефекти, які раніше не спостерігалися тривають протягом більше 3-5 днів, потрібно призупинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Передозування

Можливе посилення зазначених побічних ефектів.

Умови зберігання

Препарат зберігати від +2° до +21° С в темному, недоступному для дітей місці.

Термін придатності

24 місяці.

Не є лікарським засобом.