

Склад

1 вагінальний супозиторій містить: *активні компоненти*: гіалуронової кислоти (у формі натрію гіалуронату) – 5 mg (мг); *допоміжні речовини*: твердий жир (напівсинтетичні гліцериди).

Властивості

Гіалуронова кислота є природним фізіологічним структурним елементом організму людини. Гіалуронова кислота зв'язує воду і утворює в'язко-еластичну мембрану-матрикс на поверхні слизової оболонки піхви. Таким чином, вона формує захисний матрикс на слизовій оболонці і допомагає відновити природне зволоження та може значно впливати на тургор та еластичність тканини і підтримувати природний процес загоєння.

Рекомендації щодо застосування

Вагінальні супозиторії з гіалуроновою кислотою "Ревітакса®" п оказані для зволоження слизової піхви з метою зменшення симптомів її сухості:

- у жінок у постменопаузі з встановленою атрофією слизової піхви та симптомами подразнення, свербіння та болю під час статевого акту (диспареунія);
- у жінок у пременопаузі після нещодавньої операції в області геніталій, зі схильністю до диспареунії;
- у жінок з дистрофією слизової оболонки піхви внаслідок іонізуючого випромінювання, кріоабляції, хіміотерапії, кортикостероїдів, оральних контрацептивів або будь-якого іншого медичного втручання.

Вагінальні супозиторії з гіалуроновою кислотою використовуються як допоміжний фактор при відновлювальних процедурах при атрофічних та дистрофічних станах слизової піхви.

Для полегшення догляду за ранами після пологів; при хірургічних операціях на піхві; після кріоабляції.

При дистрофіях після хіміотерапії іонізуючим випромінюванням - лазером; при старечій сухості; при недостатності естрогенів через природну менопаузу; а також через менопаузу, викликану медичними причинами, наприклад гістеректомія, оваріектомія; при тривалому прийомі кортикостероїдів та оральних контрацептивів.

Спосіб застосування

Вагінальні супозиторії застосовують один раз на добу (ввечері) перед сном або відповідно до порад лікаря. Вагінальний супозиторій слід вводити глибоко в піхву, у положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Якщо супозиторій є надто м'яким для введення, його слід охолодити в холодильнику протягом кількох хвилин або під струменем холодної води, не виймаючи з блістера. Тривалість використання зазвичай становить 30 днів, але може бути збільшена відповідно до стану та вказівок лікаря або фармацевта. Жінкам у пременопаузальному періоді із недавніми хірургічними втручаннями в зоні статевих органів тривалість застосування залежить від ходу загоєння.

Жінкам у постменопаузальному періоді із вагінальною атрофією і сухістю через низькі рівні ендогенних естрогенів рекомендоване систематичне застосування засобу, при цьому, в залежності від статевого життя, застосування може бути переривчастим.

У осіб, які отримують опромінення, медичний виріб слід застосовувати паралельно із радіо терапією.

Особливості застосування

Тривале використання засобів, призначених для місцевого застосування, може викликати реакції гіперчутливості. У цьому випадку слід припинити застосування продукту та звернутися до лікаря. Не ковтати. Уникати потрапляння в очі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента.

Форма випуску

Супозиторії вагінальні. По 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла та джерел тепла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C

Термін придатності

36 місяців від дати виготовлення.

Термін придатності зазначено на упаковці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник

ХЕЛП С.А., вул. Валаорітоу, 10, 144 52 Метаморфозіс Аттіка, Греція / HELP S.A., 10, Valaoritou str., 144 52 Metamorfosi Attiki, Greece

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», вул. Перемоги, буд. 9, офіс 20, Київ, 03170, Україна.