

Склад

100 г розчину містять 2-пропанол — 63 г, бензалконію хлорид — 0,025 г;

допоміжні речовини: барвники: оранжево-жовтий S (E 110), хіноліновий жовтий (E 104), діамантовий чорний BN (E 151), вода очищена.

Лікарська форма

Розчин нашкірний, спиртовий.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТС D08A X53.

Засіб має пролонговану бактерицидну (у т. ч. по відношенню до MRSA/ЕНЕС1) та інших антибіотикорезистентних бактерій), фунгіцидну, туберкулоцидну дію. Інактивує віруси гепатиту В та С, ВІЛ, герпесу типу 1, рота-, вакцинієвіруси тощо. Спиртова складова препарату одночасно зі швидким ефектом антимікробної дії забезпечує знежирювальне очищення шкіри, а також проникнення бензалконію хлориду у глибші шари шкіри, за рахунок чого забезпечується пролонгована дія препарату. Кутасепт® Г сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання засобу.

Рекомендації щодо застосування

Перед- та післяопераційна обробка шкіри та операційних швів, антисептична обробка шкіри перед ін'єкціями, забором крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, при дрібних травмах та інфекціях шкіри бактеріальної та грибкової етіології. Гігієнічна та хірургічна обробка шкіри рук.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати для антисептичної обробки слизових оболонок. Не допускати контакту зі слизовими оболонками очей.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю застосування можливе після консультації з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Кутасепт® Г — готовий розчин для зовнішнього застосування. Завдяки інтенсивному кольору добре маркує операційне поле. Місце маніпуляції або уражену ділянку необхідно повністю зволожити препаратом. Антисептична обробка та очищення шкіри перед ін'єкціями: — шкіра з великою кількістю сальних залоз (400–900 залоз/см²). Для поверхонь долоней діють рекомендації з антисептичної обробки шкіри рук.

Діти

Не можна застосовувати препарат для обробки шкіри новонародженим та недоношеним дітям. В інших випадках препарат застосовують за призначенням лікаря.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Легкозаймистий препарат. Слід дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи зі спиртовмісними засобами. Зберігати при температурі не вище + 25 °С у місцях, недоступних для дітей.

Упаковка

Флакон по 1000 мл.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

БОДЕ Хемі ГмбХ.