

Склад

Каротин, вітамін Е (токоферон), вітамін В₁ (тіамін), фруктові кислоти, вітамін С, еластин, колаген, вітамін К, флавоноїди, фосфаліпіди, сератонін, В₂ (рибофлавін).

Рекомендації щодо застосування

Протизапальна, відновлююча, протимікробна, біостимулююча, підсилює вироблення ферментів підшлунковою залозою, і навпаки знижує секрецію шлункового соку. Створює обволікаючу плівку на слизовій або шкірі, захищаючи мембрани клітин від руйнування і одночасно забезпечуючи їх всім необхідним. Зменшує вміст холестерину, запобігаючи атеросклерозу, підтримує тонус судин, покращуючи їх еластичність. Сприяє нормалізації функції залоз внутрішньої секреції: щитовидної, надниркової, статевої.

Застосування

- як полівітамінний засіб при гіпо- або авітамінозах, астенії у дорослих - по 1 ч. л. за півгодини до їди;
- при хронічних запальних процесах, після операцій як імуностимулятор, для відновлення тканин - по 1 ч.л.;
- при гастритах, виразках шлунку, колітах, запорах, зниженій руховій активності кишечника, токсичних ураженнях печінки, панкреатитах, пухлинах та ін. проявляє протизапальну та загоювальну властивість. Вживати по 1 ч.л. до їди і у вигляді мікроклізм.

Побічні ефекти

Гіркота у роті, індивідуальна непереносимість препарату.

Протипоказання

При запальних процесах жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, жовчнокам'яній хворобі.

Умови зберігання

В сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C і відносній вологості повітря не вище 75%. Після першого використання, продукт зберігати в холодильнику.