

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Cimicifuga C200 – 0,8 мг, Lachesis C50 – 0,8 мг, Apis C200 – 0,8 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою, білого або майже білого кольору

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості**

Препарат усуває вегетосудинні розлади, зумовлені гормональним дисбалансом, який характерний для передклімактеричного та клімактеричного періодів. Чинить помірну седативну дію.

## **Показання**

Застосовується як симптоматичний засіб у терапії проявів клімактеричного синдрому (дратівливість, емоційна лабільність, порушення сну, головний біль, запаморочення, серцебиття, підвищена пітливість, припливи).

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; вагітність і період годування груддю.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.

За необхідності препарат можна застосовувати сумісно з іншими засобами.

## **Особливості щодо застосування**

До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

**Хворим на цукровий діабет** слід пам'ятати, що 1 таблетка препарату містить 0,2136 г лактози, що відповідає 0,018 хлібним одиницям (ХО). Максимальна добова доза препарату становить 4 таблетки, що відповідає 0,072 ХО.

В період проведення курсу лікування препаратом рекомендується не рідше 1 разу на 2 місяці консультиватися з лікарем з метою можливої корекції терапії.

При прийомі гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове загострення наявних симптомів (первинне погіршення). У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультиватися з лікарем.

### **Застереження**

Препарат протипоказаний до застосування у жінок в період вагітності та годування груддю.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами**

Дані про вплив на швидкість реакції відсутні, тому слід приймати препарат з обережністю.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат приймають внутрішньо. Разова доза – 1 таблетка. Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Препарат приймають щодня 2 рази на добу, вранці і ввечері.

При тяжкому перебігу клімаксу можливе збільшення кількості прийомів препарату до 3–4 разів на добу.

Рекомендована тривалість лікування препаратом – 1–2 місяці.

За необхідності курс лікування можна повторити через 2–3 тижні.

### **Діти**

Препарат не застосовують дітям.

## **Передозування**

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

## **Побічні ефекти**

Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ЗАТ Сантоніка.