

Склад

1 стік містить: наповнювач (еритритол); вітамін С (у вигляді натрію аскорбату та L- аскорбінової кислоти); антиспікаючий агент (кремнію діоксид); ароматизатор яблуко; цинк (у вигляді цинку цитрату); підсолоджувач (цукралоза); вітамін D₃ (у вигляді холекальциферолу).

Рекомендована щоденна порція містить:

Інгредієнт	1 стік	2 стіки
Вітамін С	240 mg (мг)	480 mg (мг)
Цинк	10 mg (мг)	20 mg (мг)
вітамін D ₃	400 МО (10 µg (мкг))	800 МО (20 µg (мкг))

Властивості

Цинк у поєднанні з вітамінами С і D₃ підтримує рівновагу імунної системи та сприяє синтезу антитіл, здійснюючи противірусну дію.

Цинк сприяє росту та розвитку клітин, нормальному функціонуванню імунної системи та забезпеченню імунологічної відповіді, підтриманню нормального зору, смаковим відчуттям та сприйняттю запаху.

Вітамін С як антиоксидантний, метаболічний та регулюючий окисно-відновні процеси засіб підвищує адаптаційні можливості організму, посилює його опірність до інфекцій.

Вітамін D₃ бере важливу участь у функціонуванні імунної системи, зумовлює підтримку тону м'язів скелетної мускулатури та впливає на згортання крові.

Рекомендації щодо застосування

Цинк у поєднанні з вітамінами С і D₃ підтримує рівновагу імунної системи та сприяє синтезу антитіл, здійснюючи противірусну дію.

Цинк сприяє росту та розвитку клітин, нормальному функціонуванню імунної системи та забезпеченню імунологічної відповіді, підтриманню нормального зору, смаковим відчуттям та сприйняттю запаху.

Вітамін С як антиоксидантний, метаболічний та регулюючий окисно-відновні процеси засіб підвищує адаптаційні можливості організму, посилює його опірність до інфекцій.

Вітамін D₃ бере важливу участь у функціонуванні імунної системи, зумовлює підтримку тону м'язів скелетної мускулатури та впливає на згортання крові.

Спосіб застосування та дози

Дітям у віці від 7 до 14 років по 1 стіку один раз на добу; дітям від 14 років і дорослим вживати по 2 стіка один раз на добу, бажано після прийому їжі.

Вміст стіку висипати на язик або розчинити у склянці питної води кімнатної температури та випити.

Тривалість споживання: 4 тижні, подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Застереження

Дітям до 7 років, вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю, застосовувати тільки за призначенням та під наглядом лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.

Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Упаковка

По 20 стіків у картонній пачці.

Маса нетто: 26,85 g (г).

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при кімнатній температурі (15-25 °C) в сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник

Вироблено в Болгарії для СОФАРМА АД вул. Ілієнське шосе, 16, 1220 Софія, Болгарія.

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «Софарма Україна», 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9-Б.