

Склад

Діюча речовина - метилтіонінія хлорид (1 мл препарату містить метиленового синього - 0.01 г);

Допоміжні речовини - етанол 40%.

Опис

Розчин водно-спиртової метиленовийсиній 1% відноситься до антисептичних засобів-барвників.

В основі механізму антисептичної дії метиленового синього лежить його здатність реагувати з певними кислими або основними групами речовин грампозитивних бактеріальних клітин, з мукополисахаридами та білками з утворенням малорозчинних і повільно іонізуючих комплексів.

Розчин застосовують при опіках, піодермії, різних гнійно-запальних процесах шкіри.

Протипоказання

- підвищена чутливість до метилтіонінію хлориду;
- вік до 1-го року.

Спосіб застосування та дози

Застосовують місцево.

Дорослим і дітям старше одного року розчином змащують уражену ділянку шкіри, захоплюючи навколишні здорові тканини.

Тривалість застосування визначається індивідуально з урахуванням ефективності лікування.

Запобіжні заходи

Не допускати попадання в очі та на слизові оболонки.

Препарат можна застосовувати в період вагітності або годування груддю тільки в разі, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду або дитини.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C, в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл у флаконі.

Виробник

ПАТ "Монфарм".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

19100 Україна, м. Монастирище, вул. Заводська, 8.