

Склад

1 стік містить активні інгредієнти: глюкозаміну сульфат - 1500 мг, хондроїтину сульфат - 1200 мг, метилсульфонілметан - 300 мг, вітамін С - 300 мг; *допоміжні речовини:* фруктоза, стевіозид, кислота яблучна, кислота лимонна; ароматизатор: лимон. Без ГМО.

Властивості

БОННІ Хондро - це додаткове джерело глікозаміногліканів - глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату та природної органічної сполуки сірки - метилсульфонілметану, які здатні поліпшити функціональний стан суглобів.

Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящів, зв'язок та сухожиль, забезпечує утворення хондроїтину сульфату, сприяє відновленню та сповільненню руйнування хрящової тканини при деструктивних змінах у суглобах, стимулює синтез протеогліканів та гіалуронової кислоти, які забезпечують покращення суглобових функцій.

Хондроїтину сульфат - один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу хрящів, сухожиль, зв'язок та кісток, сприяє захисту хряща, нормалізації вироблення суглобової рідини та зменшенню вираженості запалення, стимулює регенерацію, перешкоджає руйнуванню хрящів і втраті кальцію кістками.

Метилсульфонілметан - органічне джерело сірки, яка підтримує гнучкість та еластичність сполучної тканини суглобів та зв'язок. Метилсульфонілметан сприяє зменшенню вираженості запалення та відновленню структури кістково-м'язової системи.

Аскорбінова кислота (вітамін С) допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової тканини.

Збалансована комбінація компонентів БОННІ Хондро потенціює дію один одного, що дає більш виражений ефект.

Рекомендації щодо застосування

Збалансований комплекс БОННІ Хондро застосовується як дієтична добавка для дорослих з метою підтримки та захисту кістково-суглобового апарату.

Спосіб застосування та дози

Перед початком застосування дієтичної добавки та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

Вживати *дорослим* по 1 стіку на добу незалежно від прийому їжі.

Перед вживанням 1 стік слід повністю розчинити в 100–200 мл теплої питної води та прийняти відразу після приготування.

Рекомендований курс і термін споживання — 3 місяці, якщо лікар не призначив інакше.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість окремих компонентів продукту; період вагітності та годування грудьми; порушення метаболізму фенілаланіну; важкі порушення функції печінки та нирок.

Застереження

На початку лікування у пацієнтів із цукровим діабетом доцільно проводити контроль рівня глюкози крові.

Дотримуватись обережності при призначенні разом з антикоагулянтами.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не застосовувати дітям.

Умови зберігання

При температурі не вище 30 °C в оригінальній упаковці в сухому та прохолодному місці, захищеному від сонячних променів та недоступному для дітей.