

Склад

Компонент	кількість в 1 саше (пакетику)	% від рекомендованої добової дози для дорослих*
Метилсульфонілметан	2500 мг	Не регламентовано
Вітамін С	150 мг	188%
Мірри сухий екстракт	100 мг	Не регламентовано
Босвелії сухий екстракт	100 мг	Не регламентовано
Цинк	6,25 мг	63%
Пантотенова кислота (вітамін В ₅)	4,5 мг	75%
Тіаміну гідрохлорид (вітамін В ₁)	1,05 мг	96%
Рибофлавін (вітамін В ₂)	1,2 мг	86%
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В ₆)	1,5 мг	107%
Мідь	0,6 мг	60%
Фолієва кислота (вітамін В ₉)	150 мкг	75%
Вітамін Н (біотин)	112,5 мкг	225%

Селен	82,5 мкг	75%
-------	----------	-----

*РДЗ – рекомендовані добові значення поживних речовин для вітамінів і мінеральних солей (для дорослих) відповідно до Регламенту (ЄС) n. 1169/2011 Reg. (UE) n. 1169/2011

Допоміжні речовини: згущувачі: камідь арабська, камідь ксантан;
підсоложувачі: мальтодекстрин, сукралоза; сахароза, ацесульфам;
антиадгезивний агент: кремній діоксид; колір: бета-каротин. Без ГМО. Не містить глютену.

Властивості

Артросульфур С – це комбінація хондропротектору (метилсульфонілметан – джерело сірки, необхідної для формування колагену хрящів), вітаміну С (кофактору для формування колагену), та екстрактів лікарських рослин, що впливають на інтенсивність запальних процесів.

Рекомендації щодо застосування

Артросульфур С може бути рекомендований як додаткове джерело біологічно-активних речовин, зокрема сірки, екстрактів лікарських рослин, вітамінів і мікроелементів. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату, профілактиці запальних і дегенеративних процесів у суглобах, які можуть супроводжуватися больовими відчуттями під час рухів.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 саше два рази на день.

Вміст саше насипати у склянку води та добре розмішати до отримання однорідного розчину. Бажано спочатку налити воду в склянку, а потім всипати вміст пакетика. Приймати приблизно через 20-30 хвилин після основних прийомів їжі (обід і вечеря). Наявність нерозчинених частинок не є ознакою зміни продукту, а пояснюється сухими екстрактами рослин, що містить продукт.

Термін вживання: 4 тижні. Збільшення терміну вживання рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Застереження

Містить підсолоджувач. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. При будь-якому відчутті дискомфорту після вживання продукту слід негайно припинити його вживання та звернутися до лікаря. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування груддю.

Форма випуску

28 саше по 5,2 г в коробці.