

Склад

1 таблетка, покрита кишково-розчинною оболонкою, містить серратіопептидазу 10 мг (мг).

Опис

Серратіопептидаза – протеолітичний фермент, одержаний з ентеробактерій *Serratia marcescences*. Виявляє протизапальну, імуномодуючу, фібринолітичну, протинабрякову та антиагрегантну дії. Використання серратіопептидази має багаторічну успішну історію у Японії та країнах Європи.

ФОРТІНАЗА випускається у спеціальних таблетках, покритих кишковорозчинною оболонкою, яка не допускає контакту серратіопептидази з агресивним середовищем шлунка та доставляє фермент безпосередньо до тонкого кишечника.

Рекомендації щодо застосування

Дієтична добавка може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування дітям від 12 років та дорослим як джерело високоактивного протеолітичного ферменту – серратіопептидази – при широкому спектрі патологій, в основі яких лежить запалення.

Рекомендується дотримуватися збалансованого раціону харчування, обмежувати цукор, сіль, солодощі, алкоголь.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування

Дітям старше 12 років та дорослим вживати по 1 таблетці 2 рази на день після їди. Таблетку слід ковтати, не розжовуючи, і запивати однією склянкою води. Максимальна добова доза, що рекомендується, – 30 мг. Доза та тривалість курсу прийому визначаються у кожному випадку індивідуально лікарем.

Застереження

Не приймати при гіперчутливості (алергії) до діючих речовин або до будь-якого іншого компонента продукту. Порушення зсідання крові.

Не перевищувати вказану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендовано консультацію лікаря.

Вагітність та годування груддю. Проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням препарату.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.