

## **Склад**

*діюча речовина:* сірка;

1 г мазі містить 0,33 г сірки;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т2.

## **Лікарська форма**

Мазь 33,3 %.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь жовтуватого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Дерматологічні засоби. Місцеві протипаразитарні, протимікробні засоби. Препарати, що містять сірку. Код АТХ D10A B02.

## **Фармакодинаміка**

Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

## **Фармакокінетика**

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

## **Показання**

Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

### **Особливості застосування**

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами не описаний.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Безпеку та клінічну ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Сірчану мазь просту застосовувати зовнішньо. Мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схема застосування препарату та вимоги щодо дотримання правил особистої гігієни визначає індивідуально лікар.

### **Діти**

Протипоказано дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

### **Передозування**

Не спостерігалось.

### **Побічні реакції**

Алергічні реакції.

**Термін придатності**

2 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 50 г у контейнерах.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).