

Склад

діюча речовина: сірка;

1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 333 мг;

допоміжні речовини: емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м'який, емульгатор «Т-2», олія мінеральна.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса жовтуватого із зеленуватим відтінком кольору.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні засоби. Препарати для лікування акне. Код АТХ D10A B02.

Фармакодинаміка

При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

Фармакокінетика

При зовнішньому застосуванні Сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання

Захворювання шкіри: себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

Протипоказання

Підвищена чутливість до препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

Особливості застосування

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо.

Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схему застосування препарату і вимоги до особистої гігієни визначають індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.

Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат можна тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

Передозування

Не спостерігалось.

Побічні реакції

Алергічні реакції.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

25 г у банці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).