

Склад

діюча речовина: холекальциферол;

1 доза спрею містить 25 мкг холекальциферолу, що відповідає 1000 МО вітаміну D₃.

допоміжні речовини: вода очищена, поліоксиетилен сорбітан-моноолеат, гліцерин, тригліцериди середнього ланцюга, ефіри аскорбінової кислоти, лимонна кислота, калію сорбат, L- аргінін, сукралоза.

Властивості

Дібустол D₃ оральний спрей, що забезпечує швидку абсорбцію вітаміну D₃. Спрей доставляє вітамін D₃ через слизову оболонку ротової порожнини безпосередньо в кров, на відміну від капсул або таблеток.

Дібустол D₃ рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D₃.

Вітамін D сприяє: нормальній роботі імунної та ендокринної системи, що покращує регуляцію обмінних процесів, метаболізму та синтезу гормонів, ферментів, лімфокінів, нейромедіаторів та біологічно активних речовин. Підтриманню кісток у нормальному стані, нормальній роботі м'язів, нормальному всмоктуванню та засвоєнню кальцію та фосфору, нормалізації рівня кальцію в крові, підтриманню зубів у нормальному стані;

Жінкам у період менопаузи, які часто хворіють на остеопороз у зв'язку з гормональними порушеннями, необхідно підвищити дозу вітаміну D₃.

Бере участь у поділі, диференціюванні і дозріванні клітин.

Показання до використання

- Застосовувати при клінічно підтвердженому дефіциті вітаміну D у дорослих.
- Профілактика дефіциту вітаміну D.
- Як доповнення до специфічної терапії остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D або з високим ризиком нестачі вітаміну D.
- Профілактика дефіциту вітаміну D в жінок при плануванні вагітності при ендометріозі, при СПКЯ.
- Профілактика дефіциту вітаміну D при мальабсорбції.
- Терапія гіпаратиреозу у дорослих пацієнтів.

Особливості застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Під час застосування Дібустол D₃ необхідно враховувати додаткове надходження вітаміну D (сумісний прийом інших препаратів, що містять вітамін D).

Комбіновану терапію із застосуванням вітаміну D або кальцію проводити під наглядом лікаря, спостерігаючи за рівнем кальцію у сироватці крові та сечі.

Необхідно з обережністю застосовувати пацієнтам із порушеною функцією нирок та контролювати рівень кальцію та фосфатів.

Спосіб застосування та дози

Для сублінгвального застосування.

Рекомендована профілактична доза становить – 1000 МО вітаміну D на добу (1 доза спрею).

Збільшення добової дози можливе після консультації з лікарем.

Струсити флакон перед використанням. Розпиліть 1 дозу спрею під язик. При одному натисканні на помпу утворюється аерозоль, в якому міститься 1 доза спрею, що забезпечує 1000 МО/25 µg (мкг) вітаміну D₃. Після використання закрийте ковпачком та тримайте флакон у вертикальному положенні.

Тривалість споживання

Тривалість застосування визначається лікарем індивідуально.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці. Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник

Лабомар с.р.л. Виа Назаріо Сауро, 35/І 31036 Істрана, Італія/ Labomar s.r.l. Via Nazario Sauro, 35/I 31036 Istrana (TV), Italy