

Склад

1 стік містить: *активні інгредієнти*:

Екстракт плодів пальми пілкоподібної (*Sirenoa repens*) – 350 мг (жирних кислот – 297,5 мг); екстракт кори сливи африканської (*Pygeum africanum*) – 100 мг; екстракт зніту вузьколистого (*Epilobium angustifolium* L) – 50 мг.

допоміжні речовини: еритритол, соняшниковий лецитин, поліоксіетиленсорбітан моностеарат, лимонна кислота, ксантанова камідь, сорбат калію, бензоат натрію, ароматизатор, сукралоза.

Опис

Проста-ЛІК – дієтична добавка в формі ультра-мікроемульсії з рослинних екстрактів пальми пілкоподібної, сливи африканської та епілобіуму, до раціону харчування дорослих чоловіків для нормалізації функціонування сечостатевої системи при хронічному простатиті, доброякісній гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ).

Проста-ЛІК сприяє зменшенню вираженості патологічних симптомів ДГПЗ (дизурія, поллакіурія, ніктурія, неповне випорожнення сечового міхура), збільшенню об'єму та сили сечовипускання. Проста-ЛІК сповільнює подальше зростання та збільшення об'єму передміхурової залози.

Показання до використання

- Доброякісна гіперплазія (аденома) передміхурової залози I і II стадії з симптомами:

- слабе або переривчасте сечовипускання;
- відчуття неповністю випорожненого сечового міхура;
- біль при сечовипусканні;
- порушення статевої функції.

- Хронічний простатит.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів Проста-ЛІК.

Особливості застосування

Проста-ЛІК тільки полегшує симптоми при збільшеній передміхуровій залозі, але не усуває саме її збільшення. Проста-ЛІК не слід застосовувати при доброякісній гіперплазії передміхурової залози у фазі декомпенсації.

Якщо скарги погіршуються або якщо такі симптоми, як лихоманка, спазми або кров у сечі, болючі сечовипускання або затримка сечі відбуваються під час використання Проста-ЛІК слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Для перорального застосування.

Вживати дорослим чоловікам по 1 стіку на день.

Перед застосуванням стіку, його слід струсити. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Тривалість споживання

Проста-ЛІК рекомендується застосовувати не менше 3 місяців. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Побічні ефекти

Рідко: нудота, печія, діарея, біль у животі. Не є лікарським засобом.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

По 20 стіків по 10 мл у коробці.

Виробник

SERIS S.R.L., Via Манейра, 17bis-18039 Вентімілья, Італія/SERIS S.R.L, Via
Maneira, 17bis-18039 Ventimiglia, Italy.

ВЕЛІТ Біофарма Срл , площа Кавур 3-20121, Мілан, Італія/VELIT Biopharma Srl,
Piazza Cavour 3-20121, Milano, Italy.