

Склад

діюча речовина: настойка евкаліпта прутовидного листя;

1 флакон 70 % 25 мл містить настойки евкаліпта прутовидного листя (*Eucalypti viminalis folia*) (1:5) (екстрагент – етанол).

Лікарська форма

Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Фармакотерапевтична група

Засоби для застосування в стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинаміка

"Евкаліпта настойка" містить комплекс біологічно активних речовин: дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки (у тому числі цинеолмоноциклічний терпен), які згубно впливають на грампозитивні, грамнегативні мікроорганізми, гриби та найпростіші. Препарат пригнічує ріст золотистого стафілокока, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби, чинить антисептичну, протизапальну, дезінфікуючу, помірну седативну (заспокійливу) дію.

Фармакокінетика

Не визначалась.

Показання

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки тяжкого перебігу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не відома.

Особливості застосування

Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати „Евкаліпта настоянку” при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується вживати внутрішньо жінкам у період вагітності чи годування груддю.

Спосіб застосування та дози

„Евкаліпта настоянку” приймають внутрішньо, а також для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15–30 крапель настоянки 3–4 рази на день після їди; дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на день після їди.

Для полоскання розвести 10–15 крапель настоянки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи препарат у нерозведеному стані або після попереднього розведення його водою (як для полоскання).

Тривалість лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту, що визначається лікарем.

Діти

Препарат застосовують дітям віком від 12 років за призначенням та під наглядом лікаря.

Передозування

Не встановлено.

Побічні реакції

При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у т. ч. кропив'янка, почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (в ділянці губ); нудота, блювання і діарея. При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).