

Склад

AQUA, UREA, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ALLIUM PORRUM EXTRACT, ALLIUM CEPA EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, CETEARETH-20, ALLANTOIN, SPONGILLA LACUSTRIS FRAGILIS, CAMPHOR, METHYLPARABEN, MENTHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, PROPYLPARABEN, BHA.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендовано в якості допоміжного засобу в комплексній терапії для зменшення та усунення рубців та косметичних дефектів шкіри, що виникають після оперативного втручання (видалення родимки і ін.), та в результаті невеликих пошкоджень шкіри, вугрового висипу (у тому числі після дермабразії); термічних опіків; лазеротерапії (у тому числі після видалення татуювань); при розтяжках, що виникають в результаті різкої зміни ваги. Застосовується з 1 року.

Протипоказання

Особам з чутливістю до окремих компонентів рецептури.

Застереження

Прочитайте уважно цю інструкцію, перш ніж розпочати застосування!

Зберігайте цю інструкцію, Вам може знадобитися перечитати її.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Спосіб застосування та дози

Для зовнішнього застосування. Застосовується лише після загоєння рани.

Проколiть мембрану туби шипом верхньої частини ковпачка. Видавіть та нанесiть крем на рубцеву поверхню. Втирати крем в проблемну дiлянку 3-4 рази на добу пiд легким тиском протягом 3-5 хвилин до повного всмоктування. Втирати круговими рухами, з легким натиском i зигзагоподiбними рухами уздовж довжини рубця або розтягування шкіри вiд центру до периферії (витрата крему в одне вживання в середньому 0,5 см крему на рубцеву поверхню площею 20-25 см²).

Уникайте контакту з очима.

Рекомендації по використанню:

НАЙОПТИМАЛЬНИШИМ Є ВИКОРИСТАННЯ КРЕМУ З 7-14 ДНІВ ПІСЛЯ ЗАГОЄННЯ РАНИ.

Причина	Період використання
При поверхневих пошкодженнях шкіри	8-12 тижнів
При розтягуванні шкіри	3-6 місяців
Рубці після вугрів	3-6 місяців
Рубці після оперативного втручання	3-6 місяців і більше

При застарілих (не більше, ніж півроку) щільних рубцях рекомендується додатково накладати оклюзійну пов'язку з кремом на ніч через день протягом 3-6 місяців.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Дата виготовлення, номер партії (серії): дивитися на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +5°C до +25°C у сухому, захищеному від світла місці.

Упаковка

Крем в тубі, 30 г (г) в картонній коробці.

Виробник

ТОВ «Георг Біосистеми».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 26555, Кіровоградська область, Голованівський район, смт Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3.