

Склад

Перметрин - 5 мг/г, малатион - 2,5 мг/г, піперонілу бутоксид - 20 мг/г;
інші інгредієнти: ізододекан, газ-розпилювач HFA 134a.

Фармакодинаміка

Фармакологічні властивості препарату обумовлені компонентами, що володіють інсектицидною властивістю. Перметрин - синтетичний інсектицид, активний відносно вошей - відноситься до групи природних піретринів рослин роду Compositae з вираженою інсектицидною властивістю. Після одноразового застосування перметрин визначається на волоссі протягом 10 днів. Результати досліджень *in vitro* показали, що перметрин має педікулоцидну і овоцидну дію на головних вошей. Піперонілу бутоксид посилює дію перметрина. Малатион пригнічує передачу нервових імпульсів у комах, пригнічуючи холіноестераз. Комбінація даних протипедиккульозних речовин, що володіють різними механізмами дії, запобігає розвитку штамів з низькою чутливістю і поява резистентних штамів.

Пара Плюс - швидкодіючий протипедиккульозний засіб, ефективно впливає не тільки на дорослих особин головних вошей, але і на їх яйця (гниди).

Малатион погано проникає через шкіру, в організмі швидко метаболізується. Метаболіти малатиона виводяться, головним чином, з сечею.

Показання

Педиккульоз волосистої частини голови.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого компонента препарату, підвищена чутливість до інших піретроїдів або Пиретрину, гострі запальні захворювання шкіри і волосистої частини голови.

У вигляді аерозолі препарат протипоказаний дітям віком до 2 років, при бронхіальній астмі, обструктивному бронхіті, в тому числі в анамнезі, в зв'язку з ризиком виникнення бронхоспазму при вдиханні аерозолі. У таких випадках рекомендується нанесення препарату на шкіру за допомогою змоченого препаратом ватного тампона. Ці застереження стосуються як хворих, так і осіб, які проводять обробку.

Застосування

Препарат призначений для зовнішнього застосування.

Короткими натисканнями з відстані 3 см препарат розпилюють на шкіру волосистої частини голови і на волосся по всій їх довжині. Тривалість експозиції - 10 хв (під час експозиції не слід накривати волосся рушником або хусткою).

Після застосування препарату голову ретельно миють шампунем.

Загиблих паразитів і їх яйця, що залишилися на волоссі, вичісують густим гребінцем.

Щоб уникнути повторного зараження необхідно обробити препаратом одяг, головні убори і постільні приналежності.

При необхідності обробку повторюють через 1 тиждень.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).