

## **Склад**

*діючі речовини:*

1 таблетка містить: Avena sativa D2 – 0,6 мг, Coffea arabica D12 – 0,6 мг, Passiflora incarnata D2 – 0,6 мг, Zincum isovalerianicum D4 – 0,6 мг;

*допоміжні речовини:* лактоза, моногідрат; магнію стеарат.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі, плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості**

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

## **Показання**

Розлади сну та підвищена нервова збудливість.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Про випадки взаємодії не повідомлялося.

Слід повідомити лікаря про всі лікарські засоби, що застосовувалися останнім часом.

## **Особливості щодо застосування**

Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Токсичність гомеопатично розведених речовин, що входять до складу лікарського засобу, при застосуванні у період вагітності та годування груддю не встановлена.

Перед застосуванням препарату у період вагітності або годування груддю слід проконсультуватися з лікарем.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Про випадки впливу на здатність керувати транспортними засобами та використовувати механізми не повідомлялося, і він не очікується завдяки гомеопатичним розведенням.

## **Спосіб застосування та дози**

Якщо не призначено інакше:

Стандартна доза:

Дорослим та дітям віком від 12 років: 1 таблетка 3 рази на добу.

Дітям віком від 2 років до 12 років застосовувати лише за рекомендацією лікаря.

Початкова доза та доза при гострих станах:

Дорослим та дітям віком від 12 років: 1 таблетка кожні ½–1 годину до 12 разів на день, потім продовжити зі стандартним дозуванням.

Дітям віком від 2 років до 12 років застосовувати лише за рекомендацією лікаря.

Таблетку тримати в ротовій порожнині до повного розсмоктування. Для дітей можна роздробити таблетку і додати до невеликої кількості води. Лікарський засіб слід застосовувати за 15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди

## **Діти**

Застосовується дітям віком від 2 до 12 років після консультації лікаря.

### **Передозування**

Не відзначалося і не очікується завдяки гомеопатичним розведенням.

При перевищенні рекомендованої дози необхідно проконсультуватися з лікарем.

### **Побічні ефекти**

Лікарський засіб «Ньюрексан®» може викликати побічні реакції. В окремих випадках повідомлялося про тимчасові шкірні реакції. Також застосування гомеопатичних лікарських препаратів може спричинити тимчасове погіршення стану (початкове загострення).

### **Термін придатності**

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

### **Умови зберігання**

Спеціальних умов зберігання не потребує.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 25 або по 50 таблеток у поліпропіленовому контейнері, 1 контейнер у картонній коробці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.